

Acacia verniciflua

synonyma: *Acacia binervata*, *Acacia exudans*, *Acacia gracilis*, *Acacia graveolens*, *Acacia leprosa* var. *binervis*, *A. var. latifolia*, *A. var. pendula*, *Acacia virgata*, *Racosperma vernicifluum*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste na Tasmánii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 8m. Povrch je lepivý. Větve mohou být v mládí převislé, hranaté a na žebrech přitiskle ochlupené. Fylodia jsou eliptická, kopinatá nebo čárkovitá, dlouhá 2 - 15cm, široká 0,2 - 3cm, mohou být ochlupená a mají 2 žilky. Květenstvím je 2 - 6tičetný hrozen vyrůstající po 2 - 3ks na 0,3 - 1cm stopce, hlávky jsou 30 - 60tičetné, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a kališní lístky jsou srostlé. Plodem je čárkovitý mírně kožovitý lusk délky do 12cm, šířky 3 - 6mm a obsahuje semena délky 3 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bacchus Marsh' - větve v mládí na žebrech drobně přitiskle ochlupené; fylodia eliptická (i kopinatá), tupá až prakticky špičatá, dlouhá 2 - 4cm, široká 0,5 - 1cm, okraj a hlavní žilky ochlupené; lusky ochlupené
- 'Casterton' - Viktoria; větve v mládí kulaté; fylodia eliptická až kopinatá, dlouhá 3 - 6cm, široká 0,5 - 2cm; hlávky kompaktní, velké, listence špičaté; lusky hole
- jižní odchylka - Viktorie, Nový Jižní Wales, Tasmánie; keř nebo strom; výška 2 - 8m; větve v mládí hranaté, žebra mohou být ochlupená; fylodia eliptická až kopinatá, špičatá, dlouhá 5 - 15cm, široká 0,5 - 3cm, okraj a hlavní žilky mohou být ochlupené
- společná odchylka - Viktoria, Jižní a Západní Austrálie, Nový Jižní Wales; keř; výška 1 - 3m; větve mohou být v mládí až převislé; fylodia jsou eliptická, kopinatá nebo čárkovitá, tupá až špičatá, mohou být zahnutá, dlouhá 2 - 7cm a široká 0,2 - 1,5cm

<https://www.rostliny.net/>