

## Juniperus oxycedrus (Jalovec červenoplodý)

synonyma: *Juniperus glauca*, *Juniperus heterocarpa*, *Juniperus oxycedrina*, *J. f. viridis*, *J. var. brachyphylla*, *J. var. wittmanniana*, *Juniperus rufescens*, *Juniperus souliei*, *Juniperus tenella*, *Juniperus wittmanniana*, *Oxycedrus echinoformis*, *Oxycedrus ericoides*, *Oxycedrus withmanniana*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Francie, Írán, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Kréta, Krym, Kypr, Makaronésie, Palestina, Portugalsko, Sierra Nevada (Španělsko), Ukrajina

Roste jižní Evropě s přesahem na Kavkaz a do Íránu v podobě stálezeleného a dvoudomého kuželovitého stromu nebo keře. Dorůstá výšky 6 - 10 (i 14)m. Borka je šedá až hnědočervená a odlupuje se v úzkých prouzcích. Koncové větvičky jsou hranaté. Listy jsou šídlovité, vyrůstají v 3četných přeslenech, ostré, tuhé, dlouhé 1 - 2cm, na horní straně mají 2 stomatální pruhy a spodní strana je kýlnatá. Samčí šištice mají barvu žlutou; samičí šištice jsou samostatné, kulaté až obvejčité, hnědočervené, průměru 1 - 1,8cm, obsahují 3 hnědočervená semena, 3 - 6 šupin, dozrávají 2. rokem a obsahují vejčitá hranatá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *badia*

- 'Hibernica'

- var. *brachyphylla* - Francie; listy kratší, méně ostré, modrozelené

- subsp. *macrocarpa* - Pyrenejský poloostrova až Kypr; vzpřímený až mírně poléhavý habitus; jehlice široké až 2,5mm; jalovičky spíše matné průměru 1,2 - 1,8cm; duny a pobřežní skály

- subsp. *oxycedrus* - Portugalsko, Španělsko, Francie a severní Afrika

Vyhovují mu skalnatá místa, makchie i garigue.

<https://www.rostliny.net/>