

Juniperus occidentalis

synonyma: Chamaecyparis boursieri, Cupressus bacciformis, Juniperus andina, Juniperus californica var. siskiyouensis, Juniperus dealbata, J. f. robinsonii, Juniperus pseudocupressus, Juniperus utahensis, Sabina occidentalis

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě jednodomého nebo dvoudomého stromu s širokou kulatou až kuželovitou korunou. Dožívá se věku 1000 - 1600let. Dorůstá výšky do 12 - 20 (i 30)m. Borka je hnědočervená až hnědá a odlupuje se v tenkých pruzích. Větve jsou rozkladité až vystoupavé, mohou být i převislé, větvičky vzpřímené a 3 - 4hranné. Listy jsou zelené, jemně zoubkované, na silných větvích dlouhé 3 - 6mm, jinde šupinovité, špičaté až tupé a dlouhé 1 - 3mm. Samičí šištice mají přímou stopku, vejčitý tvar, barvu modrou až modročernou, délku 0,5 - 1cm a obsahuje 2 - 3 semena délky 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. australis/subsp. australis - Kalifornie; zpravidla dvoudomé; borka hnědá; samičí šištice dlouhé 0,7 - 1cm
- 'Sierra Silver' - zkroucený habitus; listy jehlicovité, šedozelené
- var. occidentalis - Kalifornie, Idaho, Oregon, Nevada, Washington; dvoudomé i jednodomé; borka hnědočervená; samičí šištice dlouhé 5 - 9mm

<https://www.rostliny.net/>