

Juniperus virginiana (Jalovec viržinský)

synonyma: *Juniperus alba*, *Juniperus arborescens*, *Juniperus argentea*, *Juniperus bedfordiana*, *Juniperus cannartii*, *Juniperus carolina*, *Juniperus caroliniana*, *Juniperus chamberlaynii*, *Juniperus cinerascens*, *Juniperus dioica*, *Juniperus foetida* var. *virginiana*, *Juniperus fragrans*, *Juniperus glauca*, *Juniperus gossainthanea*, *Juniperus hermannii*, *Juniperus nutans*, *Juniperus polymorpha*, *Juniperus schottii*, *Juniperus smithipendula*, *Juniperus tripartita*, J. f. *albospica*, J. f. *bremerae*, J. f. *elegantissima*, J. f. *glauca*, J. f. *glauca-pendula*, J. f. *plumosa*, J. f. *smithii-pendula*, J. f. *variegata*, J. subsp. *crebra*, J. var. *chamberlaynii*, J. var. *crebra*, J. var. *elegantissima*, J. var. *freneloides*, J. var. *glauca*, J. var. *hermannii*, J. var. *pendula*, J. var. *pendula-viridis*, J. var. *plumosa-argentea*, J. var. *smithii*, J. var. *tripartita*, J. var. *variegata*, J. var. *vulgaris*, *Sabina alba*, *Sabina fragrans*, *Sabina glauca*, *Sabina gossainthanea*, *Sabina virginiana*, *Sabina virginiana* var. *crebra*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Severní Ameriky v podobě stálezeleného stromu. U nás se uměle vysazuje zejména v rozkladitých keřovitých kultivarech. Dorůstá výšky 20 (i 30)m a šířky 4m v úzkém kuželovitém až sloupovitém tvaru. Borka je červenohnědá a odlupuje se ve vertikálních pruzích. Větvičky jsou 4hranné, zpravidla slabší než 1mm a jsou mírně aromatické. Na mladších exemplářích vyrůstají jehlicovité listy, jsou vstřícné, na okraji světlé, dlouhé 0,5mm, na starších exemplářích šupinovité, dlouhé 3 - 6mm. Samčí květenství má barvu žlutou, samičí zelenou. Samčí šištice jsou dlouhé 2 - 3mm, široké 1,5mm, samičí šištice vejčité až prakticky kulaté, modročerné až hnědomodré, ojíňené, pryskyřičnaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 3 - 5,5mm, vyrůstají na rovné stopce, obsahují 1 - 2 (i 3) vejčitá semena délky 3 - 5mm, šířky 3 - 4mm a dozrávají 1. rokem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albospica'/'White Top' - konce větviček bílé; špatně snáší mráz
- 'Blue Arrow' - úzce vzpřímený habitus; listy jehlicovité, modré
- 'Blue Cloud' - široce keřovitý habitus; výška do 1,5m; větvičky tenké až drátovité, převislé; listy jehlicovité i šupinovité
- 'Blue Flame' - asymetricky hustě pyramidální habitus; listy v době plodu stříbřitě modré, jinak šedozelené; plodí každý 2. - 3. rok
- 'Blue Mountain' - široký habitus; listy namodralé; v 15ti letech výška 2,5 - 3m, šířka 1,5m; listy šupinovité, mírně ostré; bohatě plodící, plody modré
- 'Boskoop Purple' - úzký sloupovitý habitus; v zimě hnědorůžovofialový; rychlý růst
- 'Burkii' - široce sloupovitý až kuželovitý habitus; výška 2 (i 3)m; větve husté, vzpřímené, bohatě krátce větvené; listy šídlovité, dlouhé 5 - 7mm, jemně špičaté, zpravidla modře pruhované, na okraji zelené, na podzim modré, v zimě narůžovofialovělé
- 'Canaertii' - úzce sloupovitý až kuželovitý habitus; výška 5 - 8m; větve vystoupavé, tlusté, větvičky krátké, husté; listy na mladých exemplářích šupinovité, na starších šídlovité, tmavězelené; plody bohaté, modrobílé
- 'Carolina' - široce keřovitý habitus; větve vystoupavé; listy šupinovité, šedozelené, při zemi jehlicovité, modrošedé
- 'Cinerascens' - kuželovitý řídký habitus; větvičky rozložené, husté, koncové krátké; listy šídlovité, zašpičatělé, šupinovité listy drobné, přitisklé, šedé až stříbrobílé; rychlejší růst
- var. *crebra* - úzce kuželovitý až sloupovitý habitus; větve vystoupavé; listy úzce vejčité, špičaté,

volnější

- 'Cupressifolia' - kuželovitý řídký habitus; listy jehlicovité, žlutozelené
- 'Elegantissima' - kuželovitý habitus; výška 2 - 3m; větvičky mírně převislé, konce žluté, později tmavězelené; listy jehlicovité i šupinové
- 'Emerald Sentinel'/'Corcorcor' - sloupovitý habitus; výška 7 - 9m; listy smaragdově zelené; samičí
- 'Fastigiata' - úzce sloupovitý habitus zakončený více špičkami; výška 5 - 6m; větve vystoupavé, větvičky tenké, modrozelené; listy šupinové, přitisklé, drobné, špičaté, modrozelené, úzké bělavé stomatální řady
- 'Filifera' - široce kuželovitý habitus; větvičky slabé až nitkovité, dlouhé; listy modrozelené
- 'Frosty Morn' - poléhavý habitus; výška do 50cm, šířka 1,5m; větvičky i konce převislé; listy šupinové, stříbřitěmodré, v zimě mírně bronzové; pomalý růst
- 'Glauca' - sloupovitý hustě větvený habitus; výška 5 (i 10)m, šířka 2,5m; listy šupinové (uvnitř rostliny i jehlicovité), drobné, přitisklé, stříbromodré, později modře zelené, v zimě mírně do bronzova; plodem je modrá bobule
- 'Glauca Pendula' - kuželovitý habitus; větve vodorovné, konce s větvičkami převislé; listy šupinové, modrozelené; samčí, bohatě žlutě kvetoucí
- 'Globosa' - kulovitý hustý habitus; výška 1m; koncové větvičky husté, slabé; listy šupinové, drobné, tmavězelené, v zimě hnědnoucí
- 'Golden Spring' - keřovitý zploštělý habitus; listy na jaře žluté, později šedožluté
- 'Greenbelt' - široce pyramidální habitus; listy zelené
- 'Grey Owl' - keřovitý habitus; výška 1 (i 3)m, šířka 1,8m; větve vystoupavé, modře ojíněné, větvičky tenké, špičky v zimě občas narůžovofialovělé; listy stříbrošedé až modrozelené
- 'Hetzii' - výška i šířka 3 - 3,5m; větve šedě zelené
- 'High Schoals' - nepravidelný pyramidální habitus; listy zelené; samičí, plody modré
- 'Hillii' - sloupovitý hustý habitus; výška 2 - 4m; větvičky krátké, koncové dlouhé 5 - 10cm; listy šídlovité, dlouhé 5 - 8mm, mají široký modrobílý stomatální pruh, okraj modrozelený, spodní strana modrozelená, zimní barva růžovofialová
- 'Hillspire' - pravidelný kuželovitý habitus; listy celoročně zelené; samčí
- 'Chamberlainii' - široký habitus; větve vodorovné až poléhavé, silné, konce větviček převislé; na koncích větví listy jehlicovité, špičaté, šedomodře ojíněné, uvnitř rostliny šupinové, tmavězelené
- 'Idyllwild' - pyramidální habitus; výška 5m, šířka 2m; listy jehlicovité, zelené
- 'Kobenzii'/f. kobenzii - úzký hustý habitus; mladé větve mají listy jehlicovité, ostré, modrozelené
- 'Kobold' - kulovitý zakrslý hustý habitus; koncové větve vzpřímené až odstálé, dlouhé 1 - 1,5cm; listy jehlicovité, husté, modrozelené, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 0,5mm, spodní strana zelená
- 'Manhattan Blue' - kuželovitý hustý habitus; výška do 4m, šířka 2,5m; listy modrozelené; samičí
- 'Monstrosa' - nízký široký habitus; větve pometlovité; pomalý růst
- 'Moonglow' - vzpřímený řídký habitus; výška 3 - 4m; listy šupinové, modrošedé
- 'Nana Compacta' - kulovitý zakrslý mírně asymetrický habitus; výška 0,8 - 1m; větve až vystoupavé, koncové bohaté, péřnaté; listy šídlovité, dlouhé 2 - 4mm nebo šupinové, modrozelené, v zimě matně růžovofialovozelelé
- 'Pendula' - převislý stromovitý habitus; výška i více než 10m; listy zpravidla šupinové, tupé, zelené, jehlicovité husté; plody bohaté, malé, modrobíle ojíněné
- 'Pendula Nana' - zakrslý habitus; výška 60cm; větve rozkladité, převislé; listy šupinové, šedozelelé
- 'Pendula Viridis' - větve převislé; listy šupinové, zelené; samičí
- 'Plumosa Argentea' - kuželovitý habitus; koncové větve krátké, špičky bílopestré, žluté nebo šedozelelé, později nazelenalé; listy jehlicovité
- 'Princeton Sentry' - úzce sloupovitý habitus; výška 8m; listy jehlicovité, modrozelené
- 'Pseudocupressus' - sloupovitý úzce špičatý habitus; výška 3 - 4m; větve vzpřímené, husté; listy jehlicovité, šídlovité, na koncích větví přitisklé, špičaté, dlouhé do 6mm, bledězelené, kýlnaté, na spodní straně modrozelené
- 'Pyramidiformis' - úzce kuželovitý habitus; výška do 15m; větvičky vystoupavé, koncové až vzpřímené, krátké, slabé; listy šupinové, přitisklé a tmavězelené

- 'Reptans' - zakrslý plazivý habitus; konce větvíček částečně převislé; listy uvnitř jehlicovité, namodrale lesklé, ostatní šupinovité, zelené; samčí
- 'Sherwoodii' - úzce kuželovitý habitus; větve na koncích na jaře bleděžluté, později zelené, v zimě fialové; listy tmavězelené
- 'Schottii' - úzce kuželovitý habitus; výška 2 - 3m; větve vystoupavé, slabé, žlutozelené; listy šupinovité, přitisklé, zelené až žlutozelené
- subsp. *silicicola*/J. *silicicola*/J. *barbadensis*/J. *lucayana* - Jižní Karolína po Floridu a Texas; zpravidla dvoudomý strom s kuželovitým habitem nebo vzpřímený keř; větve rozkladité; listy šupinovité, vejčité až mírně 3úhlé, špičaté až otupělé
- 'Silver Spreader' - zploštělý široký habitus; výška do 2m; větve vystoupavé; listy zpravidla jehlicovité, šedo-zelené až stříbrošedé, později zelené
- 'Skyrocket'/J. *chinensis* 'Skyrocket'/J. *scopulorum* 'Skyrocket' - velmi úzce sloupovitý habitus; výška 4 - 5m, šířka 40 - 50cm; větve vystoupavé; listy jehlicovité, modrošedé
- 'Sparkle' - úzce sloupovitý habitus; listy modrošedé, bíle tečkované
- 'Sulphur Spray' - listy na mladých exemplářích žlutě zelené, později šedě zelené
- 'Taylor' - úzce sloupovitý; výška 8m, šířka 1m; listy smaragdově zelené
- 'Triomphe d'Angers' - kuželovitý řídko větvený pravidelný habitus; koncově větve krátké, bílopestře; listy jehlicovité, modrozelené
- 'Tripartita' - zakrslý asymetrický keřovitý habitus; výška 2 - 3 (i 4)m, šířka min. stejná; větvičky rozkladité až vzpřímené, konce mírně převislé; listy zpravidla jehlicovité, na koncích větví přitisklé, modrozelené

Je mrazovzdorný. Vyhovují mu hluboké vlhké půdy, dokáže ale přežít i sucho, potřebuje plné slunce (i polostín).

<https://www.rostliny.net/>