

Abies cephalonica (Jedle řecká)

synonyma: *Abies acicularis*, *Abies alba* subsp. *cephalonica*, *Abies alba* var. *cephalonica*, *Abies apollinis*, *Abies apollinis* var. *panachaica*, *Abies apollinis* var. *reginae-amaliae*, *A. f. pseudocilicica*, *A. subsp. apollinis*, *A. subsp. peloponnesiaca*, *A. var. apollinis*, *A. var. appolinis*, *A. var. arcadica*, *A. var. heterophylla*, *A. var. parnassica*, *A. var. peloponnesiaca*, *A. var. reginae-amaliae*, *Abies luscombeana*, *Abies panachaica*, *Abies peloponnesiaca*, *Abies peloponnesica*, *Abies picea* var. *apollinis*, *Abies reginae-amaliae*, *Picea apollinis*, *Picea apollinis* var. *panachaica*, *Picea cephalonica*, *Picea cephalonica* var. *panachaica*, *Pinus abies* var. *apollinis*, *Pinus abies* var. *cephalonica*, *Pinus abies* var. *panachaica*, *Pinus apollinis*, *Pinus cephalonica*, *Pinus cephalonica* var. *reginae-amaliae*, *Pinus picea* var. *graeca*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Malá Asie (Anatolie), Řecko

Pochází z horských pásem Řecka a Turecka. Patří mezi stálezelené rostliny. Dorůstá výšky v místě původu až 30m, šířky do 15m s průměrem kmene 2,7 - 4,5m, u nás vysoká kolem 15m. Vytváří kuželovitý a pyramidální tvar, později válcovitý. Pod zemí vytváří kůl a silný kořenový systém. Borka je šedohnědá, hladká, později rýhovaná, rozpraskaná na obdélníčky. Větve jsou hladké, hnědé nebo červenohnědé, pupeny vejčité nebo kuželovité, pryskyřičnaté, fialové až červené s průměrem 1,2 - 1,6mm. Jehlice vyrůstají ve šroubovici, na spodní straně jsou kýlnaté, na horní lesklé, tmavězelené s 2 - 3mi krátkými stomatálními proužky, spodní strana je zelenobílá s 6 - 7mi krátkými stomatálními proužky, mají délku 1,5 - 3 (i 3,5)cm, šířku 2 - 3mm, na řezu zploštělé, konec špičatý. Samčí šištice jsou vejčité, žluté, dlouhé 1,4cm, široké 4mm, samičí jsou úzce válcovité, hnědočervené až fialové, mírně pryskyřičnaté, dlouhé 12 - 20cm, široké 3,5 - 5cm, šupiny klínovité, mírně 3úhlé, listeny krátké, žlutohnědé, vzpřímené, 3úhle špičaté, 2/3 délky šupin. Semena jsou hranatá, červená, okřídlená a dlouhá 1,2 - 1,9cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Acicularis' - jehlice jemné, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 0,5 - 1mm
- 'Aurea'/'Aureovariegata' - mladé větve žluté
- 'Barabit's Gold' - jehlice žluté
- 'Hunnewell'/'Hunnewell Broom' - čarověník; zakrslý, později kulovitý; roční přírůstek 5cm
- 'Latifolia' - jehlice široké, volnějšší
- 'Mayer's Dwarf'/'Nana' - široký nízký habitus; jediný vrcholový výhon; větve kratší; jehlice dlouhé 0,8 - 1,5cm
- 'Pyramidalis' - pyramidální habitus
- 'Robusta' - hustý kompaktní habitus; větve silné, dlouhé, vzpřímené, spodní k zemi ohnuté, spirálovité; jehlice husté, na spodní straně modrobílé; šišky větší, podpůrné šupiny širší i delší
- 'Rubiginosa' - při rašení tmavě rezavohnědá, brzy zelená
- 'Submutica' - šišky dlouhé 10 - 12cm, ve střední 1/3 jsou podpůrné šupiny celé skryté

Je odolná vůči počasí, nemá ráda pouze nízké teploty ze severní části Evropy. Je náchylná na pozdní mrazíky. Půda by měla být hlubší, hlinitopísčítá, mírně vlhká. Dokáže růst ale i v chudší vápenité půdě.

<https://www.rostliny.net/>