

Abies pindrow (Jedle Pindrow)

synonyma: *Abies chiloensis*, *Abies himalayensis*, *A. var. intermedia*, *Abies webbiana* var. *pindrow*, *Picea herbertiana*, *Picea pindrow*, *Pinus pindrow*, *Pinus spectabilis* var. *pindrow*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Afganistán, Nepál, Pákistán, Z Himálaj

Pochází ze západního Himálaje. Roste v podobě stromu s úzkou kuželovitou korunou. Dorůstá výšky 30 - 60m při průměru kmene do 2,4m. Borka je v mládí hladká a šedá, později šedohnědá a brázditá. Větve jsou kulaté, žlutošedé, holé, pupeny kulovité, velké a pryskyřičnaté. Jehlice jsou na horní straně větví paprscitě uspořádané, na spodní hřebenité, dlouhé (2 -) 3 - 4 (i 6)cm, široké 1,5 - 2mm, 2klané (v mládí pouze špičaté), horní strana zelená až tmavězelená, lesklá, spodní šedozeleň s 2mi šedými pruhy průduchů z 5 - 6 stomatálních řad. Samičí šištice válcovité, dlouhé 10 - 18cm, široké 6 - 7cm, v mládí tmavě růžovofialové, později hnědé, semenné šupiny široké 3cm. Semena jsou dlouhá 1 - 1,2 (i 2)cm a mají 2x delší křídlo. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brevifolia*/*A. gamblei* - větve červenohnědé; jehlice dlouhé 1,5 - 3,5cm, tužší, špičaté
- var. *intermedia* - přechod mezi *A. pindrow* a *A. spectabilis*; borka, pupeny i větve podobné *A. pindrow*, ale jehlice hřebenité, dlouhé až 5,5cm
- 'Variegata' - jehlice žlutě pruhované anebo na okraji zbarvené

Je velmi choulostivá. Snáší mráz pouze do -5°C, u nižších hrozí namrznutí nebo kompletní zmrznutí. Růst je pomalý.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>