

Abies spectabilis (Jedle východohimalájská)

synonyma: *Abies brevifolia*, *Abies chilrowensis*, *A. subsp. langtangensis*, *A. var. brevifolia*, *A. var. langtangensis*, *Abies webbiana*, *Abies webbiana var. brevifolia*, *Picea naphta*, *Picea webbiana*, *Pinus spectabilis*, *Pinus tinctoria*, *Pinus webbiana*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Afganistán, Himálaj, Kašmír, Nepál, Pákistán, S Indie, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Afganistánu, Indii, Kašmíru a Nepálu v podobě stromu se široce kuželovitou korunou. Dorůstá do výšky do 50 (i 60)m při průměru kmene i více než 1,5m. Borka je drsná, šupinatá, tmavěšedá. Větve jsou vodorovné, v mládí žlutošedé, hnědé nebo červenohnědé, rýhované, ochlupené nebo holé, hustě obrostlé, zimní pupeny kulovité nebo vejčité a pryskyřičnaté. Jehlice na horní straně plodících větví vystoupavé, u mladých větví hřebenité, horní strana tmavězelená, lesklá, spodní strana má 2 bílé pruhy a 2 okrajové pryskyřičné kanálky, délka 2 - 6cm, šířka 2 - 2,5mm, konec vykrojený nebo 2klaný. Samičí šištice v mládí růžovofialové, později tmavěhnědé nebo modrohnědé, narůžovofialovělé, válcovité, dlouhé 8,5 - 20cm, široké 4,5 - 7,5cm, semenné šupiny ve středu šištice vějířovitě lichoběžníkovité, dlouhé 2,3 - 2,8cm, široké 2,8 - 3,4cm, listeny lopatkovité, nevyčnívající s délkou 1/3 až 1/2 semenných šupin. Semena jsou dlouhá 1cm, křídlo široce klínovité, delší semena, konec uťatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Affinis' - jehlice na spodní straně modrobílé

- var. *brevifolia* - větve šedé, hladší; jehlice dlouhé 3cm, spodní strana má nápadnější šedé pruhy

<https://www.rostliny.net/>