

Abies bornmuelleriana (Jedle Bornmüllerova)

čeleď: Pinaceae

oblasti: Černé moře, Malá Asie (Anatolie)

Roste u Černého moře a v Turecku v podobě vysokého až k zemi větveného stromu. Pod zemí vytváří hluboký kořenový systém. Kmen zůstává dlouhou dobu hladký. Větve jsou v mládí vystoupavé, pak vodorovné, zprvu zelené, později hnědé, holé, pupeny vejčité, špičaté a pryskyřičnaté. Jehlice jsou velmi husté, tuhé, dlouhé 2,5 - 3,5cm, kulaté až vykrojené, na spodních větvích špičaté, široké 2mm, na horní straně od konce do středu se stomatálními pruhy, na spodní straně s 2mi bílými pruhy. Šišky jsou válcovité, dlouhé do 15cm, široké do 5cm, šupiny široké 2,5 - 4cm, podpůrné vyčnívají a jsou zpětně zahnuté, dlouhé do 1cm, zakončené dlouhou špičkou.

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Archer' - nižší, rozkladitá
- 'Franke' - zploštěle kulovitý habitus; jehlice zelené

Je velmi otužilá s nároky podobnými J. řecké nebo bělokoré.

<https://www.rostliny.net/>