

# Berberis calliobotrys

synonyma: *Berberis aitchisonii*, *Berberis crataegina* var. *cabulica*, *Berberis gambleana*, *Berberis wazaristanica*

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pakistánu, vzácně v Kašmíru v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Stonky jsou hnědočervené až světlehnědé, přírůstky zpravidla dlouhé 1 - 2cm a mají 3četné trny délky 1 - 2cm. Listy jsou variabilní, obkopinaté až obvejčité, přisedlé nebo s řapíky délky až 5mm, zpravidla celokrajné nebo s 1 - 4mi ostny na okraji, zelené, na vrcholu zpravidla hrotité, dlouhé 1 - 3,5cm, široké (0,2 -) 0,4 - 1,2cm, spodní strana může být až bělavá a ochlupená. Květenstvím je (2 -) 5 - 10tkvětý hrozen délky 1 - 3cm na 0,1 - 1cm stopce, vlastní květy jsou žluté, průměru 6 - 8mm, mají 0,5 - 1,2cm stopku, vnější kališní lístky délky 4mm, šířky 2 (i 2,5)mm, vnitřní jsou dlouhé 6mm, široké 4 (i 4,5)mm, korunní lístky jsou dlouhé 5,5 (i 6)mm a široké 3mm. Plodem je vejčitá černá bobule délky (5 -) 6 - 8 (i 9)mm, šířky 4 - 5 (i 6)mm a obsahuje 2 semena délky 3 - 5mm a šířky 2 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>