

Pinus ayacahuite (Borovice mexická)

synonyma: *P. subsp. neorecurvata*, *P. subsp. oaxacana*, *P. var. oaxacana*, *Pinus buonapartea*, *Pinus colorado*, *Pinus don-pedrii*, *Pinus durangensis*, *Pinus hamata*, *Pinus loudoniana var. don-pedrii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Chiapas, Guatemala, Guerrero, Honduras, Oaxaca, Puebla, Salvador, Veracruz

Pochází z pobřeží jižního Mexika, Guatemaly a Hondurasu. Dorůstá výšky 30 (i 45)m s průměrem kmene až 2m. Kmen je rovný. Vytváří kuželovitou až pyramidální řídkou korunu. Borka je tenká, hladká, v mládí šedá, později drsná, šedohnědá. Větve jsou dlouhé, štíhlé, spodní obvykle převislé, vyrůstají v přeslenech vodorovně a na konci jsou stočené vzhůru. Každý svazek jehlic obsahuje 5ks, stříbrné až modrozelené, dlouhé 10 - 18 (i 20)cm, svěšené, na spodní straně zelené, na horní sivozelené, okraj je pilovitý, mohou být mírně zkroucené, pryskyřičných kanálků bývá 2 - 4, pochvy jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm a mají 5 - 7 oranžovohnědý nebo červenohnědých šupinek. Samčí šištice jsou seskupené na koncích větví, jsou vejčité až krátce válcovité, dlouhé 0,7 - 1cm, žluté, později oranžovohnědé. Samičí šištice bývají v přeslenu po 2 - 4ks, jsou mírně zakřivené, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 7 - 15cm, semenných šupin je 100 - 1500, jsou krátké, ohebné, dlouhé 5 - 7cm. Délka šišek je 25 - 30 (i 45)cm a mají sklony být k zalité pryskyřici. Semena jsou bleděhnědá s tmavými tečkami a křídlem délky 3 - 4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brachyptera* - Mexiko; semena mají krátká křídla, semena jsou naopak větší
- var. *veitchii*/*P. veitchii* - Mexiko; větší šišky, semena dlouhá až 1,2cm, křídlo je stejné

Daří se jí i na větrem chráněných lokalitách. Odolává teplotám do -15°C.

<https://www.rostliny.net/>