

Pinus caribaea (Borovice karibská)

synonyma: *Pinus bahamensis*, *P. var. anomala*, *Pinus hondurensis*, *Pinus recurvata*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Belize, Havajské ostrovy, Kuba, Portoriko

Pochází ze střední Ameriky z Karibiku. Roste v podobě stromu s vejčitou nepravidelnou korunou. Dorůstá výšky 15 - 40m při průměru kmene 1m. Kmen bývá z větší části holý bez větví. Borka je šedá nebo světle červenohnědá, rozpukaná a odlupuje se velkými plochými destičkami. Mladé větve jsou zelené, později oranžovohnědé. Zimní pupeny jsou válcovité. Jehlice vyrůstají po (2 -) 3ks ve svazečku, na mladých stromech obvykle po 4 - 5ks. Jsou matně zelené, tmavězelené nebo světle žlutozelené, dlouhé 15 - 30cm, široké 1,5mm, stomatální řady jsou na obou stranách, pryskyřičných kanálků je (2 -) 3 - 4 (i 8), okraj je jemně pilovitý, pochvy vytrvávají, jsou dlouhé 1,2cm, v mládí bleděhnědé, později černohnědé. Samičí šištice jsou terminální, vejčitě válcovité, dlouhé 5 - 12cm, široké 3 - 6cm, šupiny odstávají. Semena bývají mírně šedě nebo bleděhnědě kropenatá, kosočtvercovitě vejčitá, dlouhá 6 - 7mm. Křídlo je bleděšedé, dlouhé 2 - 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bahamensis*

- var. *hondurensis*

Odolává teplotám do -9°C.

<https://www.rostliny.net/>