

Pinus cembroides (Borovice limbovitá)

synonyma: P. var. bicolor, P. var. llaveana, P. var. remota, Pinus discolor, Pinus llaveana, Pinus osteosperma, Pinus remota

čeleď: Pinaceae

oblasti: Arizona, Mexiko, Nové Mexiko, Texas

Vyskytuje se v Mexiku a USA. Roste v podobě bohatě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 15m při tloušťce kmene do 30cm. Koruna je zakulacená až okrouhlá. Borcka je červenohnědá až tmavěhnědá, mělce nepravidelně rýhovaná, rýhy jsou široké. Větve jsou rozkladité, vystoupavé, v mládí červenohnědé, později šedé až šedohnědé, pupeny jsou vejčité až krátce válcovité, světle červenohnědé, dlouhé 0,5 - 1,2cm, mírně pryskyřičnaté. Jehlice jsou ve svazku po (2 -) 3 (i 4)ks a zůstávají na stromě 3 - 4 roky. Mají délku 2 - 6cm a šířku 0,6 - 1mm, barva je modrozelená až šedozeleň, spodní strana nevýrazně bělavá se stomatálními řadami, okraj je celokrajný až jemně pilovitý, konec úzce vejčitý nebo šídlovitý, pochva má délku 5 - 7mm. Samčí šištice jsou eliptické, dlouhé až 1cm, žluté. Samičí šištice dozrávají 2. rokem, jsou symetrické, před otevřením vejčité, po otevření zploštěle vejčité až téměř kulovité, velké 1 - 3,5cm, barva je světle žlutohnědá nebo světle červenohnědá, jsou pryskyřičnaté, téměř přisedlé nebo krátce stopkaté. Semena jsou vejčitá až obvejčitá, dlouhá 0,7 - 2cm a nemají křídla. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blandsfortiana' - zakrslý, v 15ti letech výška 25cm; větve husté, krátké, tlusté, pružné, pupeny obvykle po 5ks, jehlice obvykle po 2 - 5tiks, délka 6 - 11cm, tvar u kratších jehlic rovný, zpětně zahnutý u delších pouze zakřivený, barva zelená
- subsp. cembroides
- subsp. lagunae

Odolává teplotám do -12°C.

<https://www.rostliny.net/>