

Berberis orthobotrys

synonyma: *B. subsp. orthobotrys*, *B. var. canescens*, *B. var. conwayi*, *B. var. rubicunda*, *B. var. rupestris*, *B. var. sinthanensis*

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Afganistán, Írán, Kašmír, Pákistán

Roste v Kašmíru a Afganistánu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 (i 2)m. Stonky bývají tmavěčervené, občas žlutooranžové nebo světlehnědé a přírůstky jsou dlouhé 1 - 2 (i 3,5)cm, trny bývají 3četné, žlutooranžové až červené nebo hnědé a dlouhé 1 - 2 (i 2,5)cm. Listy jsou tvarově různé, zpravidla obvejčité až podlouhlé, mají 5 - 15 (i 20) ostnitě pilovitých zubů, dlouhé 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm, široké 0,5 - 1,5 (i 2)cm a řapíky jsou dlouhé do 5mm. Květenstvím je okoličnatý hrozen, zpravidla 5 - 20 (i 25)tkvětý, dlouhý 1,5 - 3 (i 4)cm, vlastní květy mají průměr 0,7 - 1,2cm, barvu žlutou nebo světle žlutou, stopky jsou dlouhé (0,4 -) 0,5 - 1,2 (i 1,5)cm, spodní zpravidla delší než horní, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 7mm, vnější jsou menší a korunní lístky jsou stejně dlouhé nebo mírně kratší. Plodem je vejčité až eliptická červená bobule délky 0,7 - 1cm, šířky 5 - 6mm a obsahuje zpravidla 3 mírně eliptická semena délky 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Auricoma' - vzpřímený habitus; listy růžovofialovo hnědé
- var. *canescens*/*B. suberecta* 'Unique' - Kašmír; listy užší, na spodní straně šedě ojněné; plody červené, dlouhé 1cm, široké 6mm

<https://www.rostliny.net/>