

Pinus fenzeliana (Borovice Fenzelova)

synonyma: *Pinus arandii* var. *fenzeliana*, *P.* subsp. *annamiensis*, *P.* subsp. *kwangtungensis*, *P.* subsp. *varifolia*, *P.* var. *annamiensis*, *Pinus kwangtungensis*, *Pinus kwangtungensis* var. *varifolia*, *Pinus parviflora* var. *fenzeliana*, *Pinus parviflora* var. *kwangtungensis*, *Pinus wangii* subsp. *kwangtungensis*, *Pinus wangii* subsp. *varifolia*, *Pinus wangii* var. *kwangtungensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Anhui, Henan, Hubei, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 50m při tloušťce kmene až 1m. Borka je tmavěhnědá nebo šedohnědá, odlupuje se. Mladé větve jsou světlehnědé, štíhlé, holé, podélně rýhované, zimní pupeny jsou válcovitě kuželovité nebo vejčité, mírně pryskyřičnaté. Jehlice vyrůstají po 5ti ve svazečku, mají 3úhlý průřez, délku 5 - 18cm, šířku 0,5 - 1mm, pružné, 3 pryskyřičné kanálky (2 okrajové, 1 středový). Samičí šištice vyrůstají po 1 - 4ks ve svazečcích na bázi větví, mají 1 - 2cm stopku, barvu zelenou, později žlutohnědou, tvar úzce vejčitý, elipticky vejčitý nebo válcovitě eliptický, délku 6 - 14cm, šířku 3 - 6cm a bývají pryskyřičnaté. Šupiny jsou téměř klínovité nebo dlouze obvejčité, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1,5 - 2cm. Semena jsou hnědá nebo světlehnědá, obvejčitě eliptická, dlouhá 0,8 - 1,5cm, široká 5 - 8mm, křídlo je zakrnělé, dlouhé 2 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dabeshanensis*/*P. dabeshanensis*/*P. arandii* var. *dabeshanensis* - Henan, Anhui, Hubei; jehlice délky 5 - 14cm; semenné šištice válcovitě eliptické, dlouhé 14cm; semena světlehnědá, křídlo velmi krátké, dřevnaté

- var. *fenzeliana*/var. *fenzeliana* - Čína, Vietnam; jehlice délky 10 - 18cm; semenné šištice jsou úzce vejčité nebo vejčitě eliptické, dlouhé 6 - 9cm; semena jsou hnědá, křídla mají délku 2 - 7mm

<https://www.rostliny.net/>