

# Pinus halepensis (Borovice halepská)

synonyma: *Pinus abasica*, *Pinus abchasica*, *Pinus arabica*, *Pinus carica*, *Pinus ceciliae*, *Pinus colchica*, *Pinus genuensis*, *P. subsp. ceciliae*, *P. var. abasica*, *P. var. carica*, *P. var. ceciliae*, *P. var. genuensis*, *P. var. minor*, *Pinus hierosolimitana*, *Pinus hispanica*, *Pinus loiseleuriana*, *Pinus maritima*, *Pinus paroliniana*, *Pinus parolinii*, *Pinus penicillus*, *Pinus pseudohalepensis*, *Pinus saportae*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Afganistán, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Gruzie, Izrael, J Itálie, Jihoafrická Republika (JAR), Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Palestina, Peloponézský poloostrov, Portugalsko, Provance, Sardínie, Sicílie, Střední Itálie, SV Řecko, Sýrie, Tunisko

Druhové jméno je odvozeno od města Alepo v Sýrii. Pochází ze suchých střeozemních strání s přesahem po Afganistán. Patří mezi stálezelené rostliny. Rozrůstá se do šířky. Dorůstá výšky (6 -) 10 - 15 (i 25)m a šířky 10m. Koruna je ve stáří deštníkovitá nebo kulovitá, nerovnoměrně tence větvená. Kmen bývá zakřivený. Borka je stříbrošedá, později hnědočervená, rýhovaná a rozpraskaná. Větve jsou husté, v mládí široké 2 - 3mm, dlouhé, mírně ojiněné, bleděšedé až zelenohnědé, holé až jemně chlupaté, pupeny jsou vejčité, dlouhé 0,5 - 1cm, bez pryskyřice, šupiny jsou zpětně ohnuté. Úzké jehlice dlouhé až 6 - 12 (i 15)cm vyrůstající v párech jsou soustředěny na koncích výhonů, mají sytě zelenou barvu, na stromě zůstávají 2 roky, jsou seskupené ve svazečcích po 2 - 3ks, okraj je jemně pilovitý, pochvy jsou dlouhé 8mm a vytrvávají. Šišky vyrůstají po 1 - 3ks, mají 1 - 2cm stopku, odstávající nebo převislé, obvykle jsou rovné, ve 3. roce široce kuželovitě podlouhlé, dlouhé (5 -) 8 - 10 (i 15)cm, široké 4 - 6cm, červenohnědé až téměř žluté, obvykle na stromě dlouho vydrží, štítek šupin je kosočtvercovitý, hladký nebo svrasklý a plochý. Semena zrají 2. rokem a vysemeňují se 3. rokem, jsou načernalá, dlouhá 5 - 6 (i 7mm), křídlo je dlouhé 1,8 - 2,8cm a barva je červenohnědá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brutia*

- var. *halepensis* (Borovice halepská pravá) - mladé větve široké 2 - 3mm, barva bleděšedá, pupeny vejčité, dlouhé 0,5 - 1cm; jehlice jsou dlouhé 5 - 8cm, široké 0,8mm, barva šedozelená; šišky jsou stopkaté, dlouhé stejně nebo o něco méně než jehlice

- var. *pithyusa*/*P. abasica*/*P. abchasica*/*P. pithyusa* - přední Asie, kavkazské pobřeží Černého moře; výška až 25m; koruna široká; kůra šedohnědá; jehlice dlouhé až 15cm, odstávají, tlustší až 1mm; šišky bývají párovité, vzácně po 3 - 4ks, krátce stopkaté, téměř přisedlé, vejčité, dlouhé 6 - 10cm, na bázi široké 4 - 5cm, kratší než jehlice, červenohnědé, štítek téměř plochý

- var. *stankewiczii*/*P. pithyusa* var. *stankewiczii* - Krym; jehlice délce 13 - 18cm, tuhé; šišky žluté, obvykle samostatné, vzácně po 2ks, tvar vejčité kuželovitý, špičatý, štítky šupin vyvýšené, okrouhle kosočtvercovité

Potřebuje teplo. Vyhovují ji suché svahy a skály.

<https://www.rostliny.net/>