

Pinus kesiya (Borovice khasijská)

synonyma: *Pinus cavendishiana*, *Pinus insularis*, *Pinus insularis* var. *khasyana*, *Pinus kasya*, *Pinus khasia*, *Pinus khasya*, *Pinus khasyana*, *Pinus khasyanus*, *Pinus langbianensis*, *Pinus szemaoensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Laos, Luzon, Myanmar (Barma), Střední Asie, SV Indie, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Indii, Laosu, Myanmaru, Filipínách, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 35m při průměru kmene do 60cm. Koruna je šrioce kupolovitá. Kůra je hnědá, nepravidelně se odlupuje, je tlustá, hluboce rýhovaná. Mladé větve jsou žlutohnědé nebo červenohnědé, lesklé, později oranžovohnědé, zimní pupeny jsou červenohnědé a kuželovité, mírně pryskyřičnaté. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 3ks, jsou štíhlé, pružné, tmavězelené, na řezu 3úhlé, délka je 10 - 22cm, šířka 0,7 - 1mm, okrajových pryskyřičných kanálků je 3 - 6, pochva je vytrvávající. Samičí šištice bývají samostatné nebo v páru, tvar vejčitý, délky 5 - 6 (i 9)cm, šířka 3,5cm, na stromě vydrží několik let, šupiny jsou podlouhlé, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 1 - 1,5cm. Semena jsou černohnědá, mírně smáčknutá, eliptická, křídlatá, dlouhá 5 - 6mm, široká 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>