

# Pinus latteri

synonyma: *Pinus ikedae*, *P. subsp. tonkinensis*, *Pinus merkusiana*, *Pinus merkusii subsp. latteri*, *Pinus merkusii var. latteri*, *Pinus merkusii var. tonkinensis*, *Pinus tonkinensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Kambodža, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Roste v Kambodži, Laosu, Vietnamu, Myanmaru, Thajsku a Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30 (i 45 - 60)m při průměru kmene až 2m. Koruna je úzká, v mládí kuželovitá, později kulovitá nebo deštníkovitá. Borka je šedohnědá, tlustá, šupinatá. Mladé větve jsou tmavěhnědé, holé, zimní pupeny válcovité. Jehlice vyrůstají po 2 ve svazečku, na řezu jsou polokulovité, dlouhé 15 - 27cm, široké 1,5mm, stomatální řady jsou na všech stranách, má 2 pryskyřičné středové kanálky, pochvy svazečků vytrvávají. Samičí šištice jsou stopkaté, později červenohnědé, kuželovité nebo vejčitéválnocovité, dlouhé 5 - 10cm, semenné šupiny jsou dlouhé 3cm, široké 1,2 - 1,5cm. Semena jsou šedohnědá, elipticky vejčitá, dlouhá 5 - 8mm, široká 4mm a křídlo je dlouhé 1,7 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>