

Ferula communis (Ločidlo obecné)

synonyma: Bubon rigidior, Ferula abyssinica, Ferula anatriches, Ferula brevifolia, F. var. anatriches, Ferula lobeliana, Ferula montis-elgonis, Ferula nodiflora

čeleď: Apiaceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, Katalánsko, Kréta, Pákistán

Roste ve středozeší jako krátkověká trvalka. Dorůstá výšky 1 - 4m. Lodyhy jsou vzpřímené a široké až 2cm. Listy jsou několikanásobně 3x peřenosečné, úkrojky čárkovité, dlouhé 1,5 - 5cm, spodní dlouhé 30 - 60cm, řapíky dlouhé, válcovité a horní mívají zvětšenou pochvu. Květenstvím je hrozen z okolíků s 20 - 40ti paprsky, okrajové okolíky bývají sterilní, obaly chybí, obalíčky jsou záhy opadavé, vlastní květy oboupohlavné (i jednopohlavné), 5tičetné, kalich je zakrnělý, korunní lístky jsou žluté a dlouhé 8mm. Plodem je eliptická zploštělá hnědá žilnatá dvounažka délky 1,2 - 1,8cm s úzkým křídlem. Využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brevifolia
- subsp. cardonae
- subsp. catalaunica - trvalka; výška 2,5m; přízemní listy 3 - 4x zpeřené, dlouhé 60 (i 80)cm; květenstvím je okolík s 10 - 30 (i 45) paprsky; plody jsou dlouhé 0,6 - 2cm
- subsp. communis (Ločidlo obecné pravé)
- subsp. linkii

Vyhovují jí úhory, suché trávníky, okraje cest a garigue.

<https://www.rostliny.net/>