

Pinus pinaster (Borovice přímořská)

synonyma: *Pinus corteana*, *Pinus detritis*, *Pinus glomerata*, *Pinus halepensis* var. *maritima*, *Pinus helenica*, *Pinus lemoniana*, *Pinus maritima*, *Pinus maritima* var. *major*, *Pinus maritima* var. *minor*, *Pinus maritimus*, *Pinus minor*, *Pinus monspeliensis*, *Pinus neglecta*, *Pinus nigrescens*, *Pinus nova-zelandica*, *P. subsp. acutisquama*, *P. var. acutisquama*, *P. var. lemoniana*, *P. var. minor*, *P. var. pendula*, *Pinus sancta-helenica*, *Pinus scarina*, *Pinus syrtica*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Havajské ostrovy, Kapsko, Katalánsko, Korsika, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Provence, S Itálie, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Tunisko, Velká Británie

Roste na horských svazích severní částí střeozemí od Portugalska po Itálii a v severní Africe (zavlečená byla ale i do JAR) v podobě stálezeleného stromu s pravidelnou, hustou, kuželovitou a později asymetrickou korunou. Dožívá se věku 300let. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 40)m a šířky 10m. Kmen bývá přímý a mírně ohýbaný. Kůra je tlustá, hnědá a hluboce podélně rozpukaná. Větve mohou být i převislé, v mládí červenohnědé, tlusté 0,7 - 1,5cm, zimní pupeny hnědé, podlouhlé a pryskyřičnaté. Jehlice šedozele až žlutozele, dlouhé až 20cm, pichlavé, mírně zkroucené, vyrůstají ve svazečcích po 2, dlouhé 10 - 20 (i 25)cm, široké 2mm, tuhé, na okraji jemně pilovité, průduchy má na všech stranách, pryskyřičných kanálků je 6 středových, pochvy vytrvávají a jsou dlouhé 2cm. Juvenilní jehlice jsou sivozele, dlouhé 3 - 6cm a vytvářejí se ve věku 2 - 5ti let. Samčí květenství má barvu žlutou, samičí červenou. Samičí šištice vyrůstají ve svazečcích po 2 - 8ks, jsou krátce stopkaté, kuželovitě vejčité nebo elipticky vejčité, mohou být asymetrické, dlouhé (8 -) 9 - 18 (i 22)cm, široké 5 - 8cm, ve zralosti lesklé, hnědé, otevírají se po 10ti letech, šupiny jsou tlusté, dřevnaté, kosočtvercovité a ostře kýlnaté. Semena jsou lesklá, černohnědá na horní straně, spodní je matně šedá, délka dosahuje 0,7 - 1,1cm, šířka 5mm, křídlo je dlouhé 1,8 - 2,5cm, široké 1cm a má hodně rovných tmavěhnědých proužků. Přechází v hnědé lesklé šišky. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aberdoniae'/*P. hamiltonii* - vysoký habitus; větve hodně rozkladité; jehlice dlouhé 15 - 25cm, nápadně rýhované, tmavězele; šišky vyrůstají obvykle samostatně, jsou válcovitě kuželovité, dlouhé do 20cm, štítek šupin je nápadně pyramidální
- 'Lemoniana'/var. *lemoniana* - koruna široká; výška 8 - 10m; bohatě větvená, větve tlusté, rozkladité; listy lesklé, tmavězele, tuhé, dlouhé, tlusté, odstávající, obvykle zkroucené; šišky samostatné, terminální dlouze stopkaté, dlouhé 6 - 11cm, leskle červenohnědé
- f. *minor* - Francie; výška 12 - 15m; jehlice kratší, více modrozele; šišky menší, vyrůstají po více ks dohromady (samostatně vzácně), délka 4 - 5cm, šířka 3 - 3,5cm, štítky šupin kosočtvercovité, pyramidální
- 'Nana'/var. *nana* - zakrslý polokulovitý na vrcholu plochý habitus; výška i šířka 1m; větve bohaté, husté, tlusté, tuhé, odstávající v ostrém úhlu, vytváří pupeny po 2 - 5ks, délky 1 - 2cm a barvy červenohnědé; jehlice kratší, tlusté, mírně zahnuté, světlezele, s větví svírají ostrý úhel
- 'Variegata'/var. *variegata* - jehlice délky 5 - 7cm, žluté, smíšené se zelenými nebo mají žlutopestré i celé větve se zelenými jehlicemi

Vyhovují jí písčité nebo kamenité půdy s kyselým pH.

<https://www.rostliny.net/>