

Pinus pseudostrobus (Borovice vejmutovkovitá)

synonyma: *Pinus angulata*, *Pinus coatepecensis*, *Pinus estevezii*, *Pinus heteromorpha*, *Pinus nubicola*, *Pinus orizabae*, *Pinus prasina*, *Pinus protuberans*, *Pinus protuberans* var. *angulata*, *P. f. megacarpus*, *P. subsp. coatepecensis*, *P. subsp. estevezii*, *P. subsp. laubenfelsii*, *P. subsp. nubicola*, *P. subsp. yecorensis*, *P. var. coatepecensis*, *P. var. estevezii*, *P. var. laubenfelsii*, *Pinus regeliana*, *Pinus yecorensis*, *Pinus yecorensis* var. *sinaloensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko, Salvador

Roste v Mexiku, Salvadoru, Guatemale a Hondurasu. Dorůstá výšky 15 - 30m při průměru kmene až 1m. Koruna je široce vejčitá, hustá. Kůra je dlouho hladká, šedá, ve stáří drsná, hnědošedá až načernalá. Větve vyrůstají v přeslenech, jsou rozkladité, v mládí tenké, tmavěhnědé, silně modře ojíňené, tlusté 4 - 8mm, světle- až tmavěhnědé nebo červenohnědé, pupeny a jehlice podobné *P. montezumae*. Jehlice vyrůstají po 5ti ks, jsou zelené až šedozelené, měkké, dlouhé 17 - 35cm, pružné, jemně pilovité, 3 pryskyřičné kanálky, pochvy hnědé, délky 1,2 - 1,5cm, vytrvávají. Šišky jsou vejčité nebo vejčitěkuželovité či dlouze kuželovité, symetrické nebo šikmé, dlouhé 5 - 14cm, vyrůstají obvykle po 2ks, jsou mírně zakřivené, mají 1 - 1,5cm stopky, některé šupiny na ni zůstávají i po opadu, štítek šupin je nerovnoměrně utvářený. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *apulcensis* - Mexiko; výška 15 - 20m; větve nápadně modře ojíňené; jehlice vyrůstají ve svazcích po 5 (i 6)ti ks, mají délku 17 - 27cm, jsou pružné, pochvy délky 1,5 - 2,5cm; šišky vyrůstají po (1 -) 3 - 4ks, jsou dlouhé 10 - 15cm, semenné šupiny jsou velké, báze široká, štítky opatřené hákovitým pupkem

<https://www.rostliny.net/>