

Pinus sabiniana (Borovice Sabineova)

synonyma: *P. f. microcarpa*, *P. var. explicata*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z Kalifornie. Pro obří šišky je vysazována v parcích v oblastech s teplejším středomořským klimatem (Krym, Černé moře). Soupeří ve velikosti šišek s rovněž kalifornskou borovicí Coulterovou. Dorůstá velikosti 15 - 20 (i 25)m při průměru kmene až 1,2m (největší exemplář má výšku 37m a průměr 1,56m). Kmen je rovný nebo pokřivený. Koruna je kuželovitá, řídká. Borka je tmavěhnědá až téměř černá, nepravidelně a hluboce brázditá, šupinatá, spodní kůra je naoranžovělá. Větve bývají vystoupavé, v mládí štíhlé, růžovofialovohnědé, později šedé, drsné. Pupsne jsou vejčité, červenohnědé, dlouhé 1cm, pryskyřičnaté. Jehlice vyrůstají ve svazcích po 3, vytrvávají 3 - 4 roky, jsou dlouhé 15 - 32cm, široké 1,5mm, mírně zkroucené, matně modrozelené, na všech stranách jsou bledé úzké stomatální pruhy, okraj je drobně pilovitý, konec špičatý a pochva má délku do 2,4cm. Samčí šištice jsou eliptické, dlouhé 1 - 1,5cm, žluté. Samičí šištice dozrávají 2. rokem, vytrvávají až 7let, jsou mohutné, těžké, téměř symetrické, před otevřením vejčité, po otevření široce až úzce vejčité nebo vejčitěválcovité, dlouhé 15 - 25cm, barvy hnědé, pryskyřičnaté a mají až 5cm stopky. Semena jsou úzce obvejčitá, dlouhá 2cm, tmavěhnědá, křídlo je široké a krátké (1cm).

Tato skoro subtropická borovice roste jen na suchých pobřežních pahorcích.

<https://www.rostliny.net/>