

Pinus tabuliformis (Borovice čínská)

synonyma: *Pinus densata* subsp. *wilsonii*, *Pinus densiflora* var. *tabuliformis*, *Pinus leucosperma*, *Pinus sinensis*, *Pinus tabulaeformis*, *P. f. jeholensis*, *P. f. purpurea*, *P. var. bracteata*, *P. var. brevifolia*, *P. var. rubescens*, *P. var. tokunagae*, *P. var. tokunagai*, *P. var. wilsonii*, *Pinus taihangshanensis*, *Pinus tokunagae*, *Pinus wilsonii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Hebei, Henan, Hubei, Korea, Liaoning, Shaanxi, Sichuan

Roste v Číně a Koreji. Mladé stromy jsou kuželovité, starším se zplošťuje vrchol. Dorůstá výšky až 25m při šířce kmene do 1m a roste hodně do šířky. Borka je šedohnědá nebo tmavěšedá, šupinatá. Větve jsou bleděhnědé nebo žlutohnědé, tlusté, holé, zimní pupeny podlouhlé, mírně pryskyřičnaté nebo bez pryskyřice, špičaté, bleděhnědé, šupiny úzké, na okraji třásnité. Jehlice vyrůstají ve svazcích po 2 (i 3)ks, jsou tmavězelené, na řezu polokulovité, dlouhé 6 -15cm, široké 1 - 1,5mm, pryskyřičných kanálků mají 5 - 9ks okrajový, vzácně 1 - 2 středové, pochvy jsou dlouhé 6mm a vytrvávají. Samčí šištice mají délku 5 - 9mm. Samičí šištice jsou krátce stopkaté, v mládí zelené, později žlutohnědé až hnědé, vejčité nebo vejčitěkulovité, dlouhé 2,5 - 9cm, široké 4 - 9cm, obvykle několik let vytrvávají, šupiny jsou dlouhé 1,6 - 2cm a široké 1,4cm. Semena jsou světlehnědá, vejčitá nebo úzce vejčitá, dlouhá 6 - 8mm, široká 4 - 5mm a křídlo je dlouhé 1,5 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *henryi*/*P. henryi*/*P. massoniana* var. *henryi*/*P. massoniana* var. *wuligensis* - Hubei, Henan, Shaanxi, Sichuan; koruna v mládí kuželovitá, později zploštělá; kůra je šedá, u báze hnědošedá, výše červenohnědá; větve červenohnědé; jehlic dlouhé 7 - 12cm, široké 1mm; semenné šištice vejčitěkulovité, dlouhé 2,5 - 5cm
- var. *tabuliformis*/*P. densiflora* var. *tabuliformis*/*P. leucosperma*/*P. sinensis*/var. *bracteata*/f. *jeholensis*/f. *purpurea*/var. *tokunagai*/*P. taihangshanensis*/*P. tokunagai* - Čína; koruna v mládí kuželovitá, ve stáří zploštělá; borka u báze šedá nebo hnědošedá, na vrcholku červenohnědá; větve hnědožluté; jehlice dlouhé 10 - 15cm, široké 1,5mm; semenné šištice dlouhé i široké 4 - 9cm
- var. *mukdensis*/*P. mukdensis* - Hebei, Liaoning, Korea; koruna v mládí kuželovitá, později plochá; borka tmavěšedá, podélně nepravidelně rýhovaná; větve hnědožluté; jehlice dlouhé 10 - 15cm, široké 0,5mm; semenné šištice dlouhé i široké 4 - 9cm
- var. *umbraculifera* - Hebei, Liaoning; koruna vějířovitá; větve hnědožluté; jehlice tuhé, dlouhé 6 - 15cm, široké 1,5mm

Je otužilá a nenáročná.

<https://www.rostliny.net/>