

Pinus torreyana (Borovice Torreyova)

synonyma: Pinus lophosperma

čeleď: Pinaceae

oblasti: Kalifornie

Pochází z USA. Dorůstá výšky 15 (i 23)m při průměru kmene do 1m. Koruna je zakulacená nebo okrouhlá či zploštělá, nepravidelná. Kmen bývá křivolaký nebo křivý. Borka je červenohnědá až růžovofialohnědá, hluboce šupinatě brázditá. Větve jsou rozkladitě vystoupavé, kandelábrovitě, v mládí nazelenalé, později tmavě šedohnědé až téměř černé, pupeny jsou kuželovitěvejčité, světlehnědé, dlouhé do 2,5cm. Jehlice vyrůstají obvykle po 5ti ks ve svazečku, vytrvávají 3 - 4 roky, mají délku 15 - 30cm, šířku 2mm, mohou být zakřivené nebo mírně zkroucené, matně šedozelené, na všech stranách se stomatálními proučky, okraj je jemně pilovitý, konec špičatý a pochva má délku až 2cm. Samčí šištice jsou vejčité, dlouhé 2 - 3cm, žluté. Samičí šištice dozrávají 3. rokem, vytrvávají až 5 let, jsou těžké, tuhé, symetrické, před otevřením vejčité, po otevření široce vejčité, dlouhé 10 - 15cm, barvy žlutohnědé až červenohnědé a mají až 4cm stopky. Semena jsou úzce obvejčítá, dlouhá 1,6 - 2,4cm a křídlo je dlouhé do 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. insularis
- var. torreyana

<https://www.rostliny.net/>