

# Pinus virginiana (Borovice virginská)

synonyma: Pinus inops, Pinus ruthenica, Pinus turbinata

čeleď: Pinaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Britská Kolumbie, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Roste na východě USA. Dorůstá výšky až 20m při průměru kmene do 1,5m. Koruna je nepravidelně okrouhlá nebo zploštělá. Borka je šedohnědá, nepravidelně šupinatě rýhovaná, při vrcholku načervenalá. Mladé větve jsou červené nebo růžovofialové, později červenohnědé nebo šedé, drsné, zimní pupeny červenohnědé, vejčité nebo válcovité, mohou být pryskyřičnaté, dlouhé 0,6 - 1cm. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, vytrvávají 3 - 4 roky, jsou tmavě až světle žlutozelené, hodně zkroucené, dlouhé 2 - 8cm, široké 1 - 1,5mm, stomatální řady jsou na všech stranách, okraj je jemně pilovitý, konec úzce špičatý a pochva má délku 0,4 - 1cm. Samčí šištice jsou elipticky válcovité, dlouhé 1 - 2cm, barva červenohnědá nebo žlutá. Samičí šištice jsou téměř přisedlé nebo krátce stopkaté, matně červenohnědé, před otevřením kopinatěvejčité nebo kopinaté, po otevření vejčité, symetrické, dlouhé 3 - 8cm, dozrávají 2. rokem, jsou téměř přisedlé nebo mají až 1cm stopky, semenné šupiny mají nápadně růžovofialovočervený nebo růžovofialovohnědý okraj. Semena jsou světlehnědá s tmavšími fleky, tvar smáčkly obvejčitý, délka 4 - 7mm a křídlo je úzké, dlouhé do 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurea' - žluté jehlice

- 'Wate's Golden' - jehlice v zimě žluté

<https://www.rostliny.net/>