

Pinus wangii (Borovice Wangova)

synonyma: *Pinus parviflora* var. *wangii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně v krasové oblasti. Dorůstá výšky do 20m při průměru kmene do 60cm. Větve jsou tmavě červenohnědé, později tmavě šedohnědé, v mládí hustě hnědě ochlupené, později holé, zimní pupeny hnědé, bez pryskyřice. Jehlice vyrůstají ve svazcích po 5ti ks, jsou tlusté, mírně zakřivené, na řezu 3úhlé, dlouhé 2,5 - 6cm, široké 1 - 1,5mm, mají 3 pryskyřičné středové kanálky. Samičí šištice vyrůstají po 1 - 3ks na bázi větví, mají 1,5 - 2cm stopky, barvu žlutohnědou, hnědou nebo tmavě šedohnědou, tvar je dlouze eliptický nebo válcovitě vejčitý, délka dosahuje 4,5 - 9cm, šířka 2 - 4,5cm, semenné šupiny jsou téměř obvejčité, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 2cm. Semena jsou světlehnědá, elipticky vejčitá, dlouhá 0,8 - 1cm, široká 6mm, křídlo je dlouhé 1,6cm a široké 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *kwangtugensis*
- subsp. *varifolia*
- subsp. *wangii*

<https://www.rostliny.net/>