

Barringtonia acutangula

synonyma: *Butonica acutangula*, *Caryophyllus acutangulus*, *Eugenia acutangula*, *Huttum acutangulum*, *Michelia acutangula*, *Stravadium acutangulum*

čeleď: *Lecythidaceae*

oblasti: Afganistán, Bangladéš, Filipíny, Indie, Malajsie, Myanmar (Barma), Nová Guinea, Pákistán, S Austrálie, SV Austrálie, Thajsko, Vietnam

Roste při pobřeží v deštných lesích jihovýchodní Asie a jižní Asie od Afganistánu po Filipíny a severovýchodní Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 20 (i 25)m. Listy mají eliptický až obvejčitý protažený tvar s tupou špičkou, délku (5 -) 6 - 15 (i 16)cm, šířku 2 - 6cm a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm. Kvete v až 75květých a až 50cm dlouhých hroznech bílými, růžovými nebo i červenými květy o průměru 2 - 3cm na (1,5 -) 3 - 7mm stopce, mají 4 kališní zašpičatělé lístky délky 2 - 3,5mm, šířky 1,5 - 3mm, korunní lístky jsou 4 (i 5), jsou eliptické a dlouhé 0,6 - 1,2cm. Plody mají vejčitý tvar délky 2 - 6cm, šířky 1 - 2,5cm a obsahují semena délky 1 - 4cm a šířky 0,5 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acutangula*
- subsp. *spicata*

<https://www.rostliny.net/>