

## Barringtonia asiatica (Barringtonie asijská)

synonyma: *Agasta asiatica*, *Agasta indica*, *Agasta splendida*, *Barringtonia butonica*, *Barringtonia senequei*, *Barringtonia speciosa*, *Butonica speciosa*, *Huttum speciosum*, *Mammea asiatica*, *Michelia asiatica*, *Mitraria commersonia*

čeleď: Lecythidaceae

oblasti: Filipíny, Indie, J Čína, JV Afrika, JV Čína, Madagaskar, Malajsie, Nová Kaledonie, Portoriko, S Austrálie, Střední Asie, SV Austrálie, Tchaj-wan, Tichý oceán, Zanzibar

Roste v mangrovech při pobřeží Indického Oceánu a na západním pobřeží Tichého oceánu od Zanzibaru po Tchaj-wan, Filipíny, Fidži, Novou Kaledonii, Cookovi ostrovy, Wallis a Futuna a Francouzskou polynésii. Jedná se o nízký nebo středně stálezelený vysoký strom o výšce 6 - 25 (i 30)m. Větve jsou mohutné. Kůra je rýhovaná. Přisedlé střídavé listy mají úzce obvejčitý tvar, jsou kožovité, lesklé, dlouhé 20 - 40cm a široké 10 - 20cm. Kvete v 3 - 7 (i 20)četném hroznu bílými květy se 4mi okvětními lístky podobajícím se díky tyčinkám o délce 7 - 9cm jehelníčku. Plody jsou vejčité, průměru 9 - 11cm, uvnitř mají 4 - 5cm semeno, tvarem připomínají díky 4bokému jehlancovitému tvaru mitru.

Vyhovují ji okraje moří, pláže ale i skaliska. Nevadí ji zasolené půdy, ale má ráda vyšší pH a dostatek živin.

Semena se šíří i po moři.

<https://www.rostliny.net/>