

Hydrangea aspera (Hortenzie drsná)

synonyma: *Hortensia aspera*, *Hydrangea alba*, *H. f. emasculata*, *H. var. angustifolia*, *H. var. cordata*, *H. var. scabra*, *H. var. strigosior*, *H. var. velutina*, *Hydrangea coacta*, *Hydrangea fulvescens*, *Hydrangea glabripes*, *Hydrangea kawakamii*, *Hydrangea oblongifolia*, *Hydrangea pubescens*, *Hydrangea vestita* var. *fimbriata*, *Hydrangea villosa*, *Hydrangea villosa* f. *sterilis*, *Hydrangea villosa* var. *delicatula*, *Hydrangea villosa* var. *strigosior*, *Hydrangea villosa* var. *velutina*

čeleď: Hydrangeaceae

oblasti: J Čína, Jáva, JV Čína, Myanmar (Barma), Sikkim, Sumatra, Tchaj-wan, V Čína, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste od Indie, přes Himálaje po Jávu a Sumatru v podobě opadavého vzpřímeného keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky i šířky 1 - 4 (i 10)m. Větve a květenství je ochlupené. Listy jsou kopinaté až vejčité či 3úhlé, 1 - 2x pilovité, dlouhé (5 -) 8 - 25 (i 35)cm, báze srdčitá až klínovitá a řapíky ochlupené, dlouhé (1 -) 4 - 20cm. Květenství je bílé, namodralé, ploché, květy na okraji sterilní, široké 8 - 30cm, 4laločné a laloky dlouhé 1 - 3,5cm. Plodem je tobolka o průměru 3 - 4mm obsahující hnědá vřetenovitá až téměř kulovitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *sapera*/*H. kawakamii*/*H. longipes* var. *lanceolata*/*H. villosa* - Čína, Myanmar, Tibet, Tchaj-wan; větve v mládí ochlupené; listy kopinaté až úzce vejčité, dlouhé 9 - 24 (i 30)cm, báze zaoblená, spodní strana sametově ochlupená a řapíky dlouhé 1 - 5cm, ochlupené
- 'Macrophylla' - listy matné, tlusté, ochlupené, tmavězelené, centrální žebro na horní straně červené, na spodní straně bledší, na podzim hnědě skvrnitě, řapíky ochlupené a růžově hnědé; květenství tvoří mírně vypouklé hlávky, sterilní květy se překrývají, mají 4 kališní růžové lístky, později hnědnou, fertilní jsou světlemodré, později tmavě modré, stopky květenství růžově červené, drsně ochlupené, stopky květů růžovočervené
- 'Mauvette' - květy růžovofialové nebo tmavší, na podzim tmavě červené, kališní lístky mírně pilovité
- 'Peter Chappel' - široké bílé hlávkovité květenství
- 'Rocklon' - velké modravé hlávkovité květenství s bílými podpurnými listeny
- subsp. *strigosa* - Čína, Myanmar a Tchaj-wan; listy kopinaté až úzce vejčité, dlouhé 5 - 35cm, široké 2 - 13cm, báze zaoblená, spodní strana ochlupená a řapíky dlouhé 1 - 5cm; krajní květy bílé až růžové
- 'Taiwanv' - hlávkovité květenství o průměru do 20cm, květy růžové, sterilní kvítky zubaté, široké i více než 2cm, fertilní květy světle růžovofialové, tyčinky modré
- 'Velvet and Lace' - listy kopinaté, zašpičatělé a dlouhé do 21cm; hlávkovité květenství o průměru do 22cm, fertilní květy růžově fialově modré, sterilní převíslé s 4 - 5ti fialovorůžovými pilovitými kališními lístky
- 'Villosa'/*H. villosa* - keř; výška do 3m, šířka do 4,5m; listy modře zelené, drsně, jemně ochlupené, na spodní straně stříbře šedé, řapíky růžové; hlávkovité vypouklé květenství, sterilní květy pohárkovité, překrývající se, 4 - 5 kališních lístků světlerůžové barvy, později přechází do modře fialové až zelené, fertilní květy modré, později tmavnou až do tmavě fialové, stopky květenství tmavě růžové, ochlupené, stopky květů červené a dlouhé

Vyhovuje jí pH 6,5.

<https://www.rostliny.net/>