

# Hornungia procumbens

synonyma: *Bursa procumbens*, *Capsella berengeriana*, *Capsella procumbens*, *Capsella procumbens* var. *davidsonii*, *Capsella procumbens* var. *integrifolia*, *Crucifera procumbens*, *Draba pumila*, *Draba pumilio*, *Draba tenuis*, *Hutchinsia diffusa*, *Hutchinsia maritima*, *Hutchinsia pauciflora*, *Hutchinsia perpusilla*, *Hutchinsia procumbens*, *Hutchinsia puberula*, *Hutchinsia reticulata*, *Hutchinsia sinensis*, *Hutchinsia speluncarum*, *Hutchinsia tenuis*, *Hutchinsia tournefortii*, *Hutchinsiella perpusilla*, *Hymenolobus divaricatus*, *Hymenolobus erectus*, *Hymenolobus pauciflorus*, *Hymenolobus perpusillus*, *Hymenolobus procumbens*, *Hymenolobus procumbens* subsp. *pauciflorus*, *Hymenolobus procumbens* subsp. *procumbens*, *Hymenolobus procumbens* var. *diffusus*, *Hymenolobus procumbens* var. *integrifolius*, *Hymenolobus procumbens* var. *maritimus*, *Hymenolobus procumbens* var. *pauciflorus*, *Hymenolobus puberulus*, *Lepidium procumbens*, *Microcardamum tenue*, *Nasturtium sinense*, *Noccaea procumbens*, *Stenopetalum incisifolium*, *Thlaspi exile*, *Thlaspi procumbens*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Andalusie, Arizona, Austrálie, Britská Kolumbie, Čile, Idaho, Írán, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Montana, Nevada, Newfoundland, Nový Zéland, Oregon, Pákistán, Quebec, Saskatchewan, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming

Roste v teplejších oblastech severní polokoule, v Čile, Austrálii a Novém Zélandu jako jednoletka. Dorůstá výšky 13 - 23 (i 30)cm. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy vytvářejí zpravidla přízemní růžici, jsou hluboce dělené až celokrajné, obrysem úzce eliptické, max. krátce řapíkaté, dlouhé 0,8 - 1,7 (i 4)cm a široké (0,2 -) 0,5 - 1cm, horní jsou menší a přisedlé. Květenstvím je (5 -) 15 - 30tikvětý hrozen prodlužující se za plodu na až 10cm, vlastní květy mají stopku délku 0,25 - 0,8 (i 1,2)cm, průměr 1,5mm, kališní lístky délky 0,8 - 1mm, šířky 0,5mm a korunní lístky délky 0,7 - 0,8mm. Plodem je šešule délky (2 -) 2,5 - 3,5 (i 4,5)mm, šířky (1 -) 1,5 - 2mm a obsahuje 2 - 12 světlehnědých eliptických semen šířky 0,4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *pauciflorus* - plodenství 4 - 20tičeté, šešule dlouhé 2mm a široké 1,8 - 2mm
- subsp. *procumbens* - plodenství 20tičeté, šešule dlouhé 2 - 3,5mm, široké 1 - 1,5mm
- subsp. *revelierei*

<https://www.rostliny.net/>