

Crassula ovata (Tlustice vejčitá)

synonyma: Cotyledon lutea, Cotyledon ovata, Crassula argentea, Crassula articulata, Crassula lucens, Crassula nitida, Crassula obliqua, Crassula portulacea, Toelkenia ovata

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Atlantský oceán, Kapsko, Katalánsko, KwaZulu-Natal, Makaronésie, Mosambik

Roste v JAR a Mosambiku v podobě sukulentního keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 3)m při průměru stonku do 20cm. Borka je stříbřitě šedohnědá, hladká, lesklá a papírovitá. Kmínky Listy jsou vstřícné, obvejčité až široce eliptické nebo mírně lžičkovité, zašpičatělé, tlusté, lesklé, tmavě zelené (na okraji i načervenalé), zaoblené se špičkou a dlouhé 2 - 3 (i 5)cm a široké 1 - 2 (i 3)cm. Kvete drobnými bílými až narůžovělými růžově tečkovanými hvězdicovitými 5tičetnými květy na 1 - 3 (i 4)cm stopce v hustý okrouhlých terminální laticích o průměru do 6cm, kalich je zvonkovitý, průměru 5mm, kališní lístky jsou široce 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,1 - 1,5cm, korunní lístky jsou podlouhlé až kopinaté, špičaté s hrotem, kýlnaté, dlouhé (0,5 -) 0,6 - 0,75 (i 1)cm. Plodem je hnědý úzce vejčitý měchýřek délky 3 - 3,25mm s drobnými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. crista
- 'Blue Bird'
- 'Gollum'
- 'Gollum Jade'
- 'Hobbit' - zakrslý habitus
- 'Monstrosa' - má téměř válcovité ztlustlé listy, roste rychle a dobře se větví
- 'Variegata'

Potřebuje dobře propustný substrát. Na vlastním složení pak již příliš nezáleží. Zimujte v chladné místnosti, není potřeba příliš mnoho světla a zálivku silně omezte. Ve chvíli, kdy tlustici budete umisťovat ven, dejte pozor, aby ji první sluníčko nespálilo listy. Vhodné je tedy nejprve otužení ve stínu a pak teprve místo na plném slunci. Hnojíme od jara do podzimu hnojivy s nižším obsahem dusíku.

<https://www.rostliny.net/>