

## Cnidium (Jarva)

čeleď: Apiaceae

Vyskytuje se v Evropě, Asii a Severní Americe. Jedná se zpravidla o trvalky nebo dvouletky, méně častěji jednoletky. Stonek bývá obvykle nevětvený. Spodní a přízemní listy jsou 1 - 3x zpeřené s čárkovitými nebo kopinatými úkrojky. Horní listy jsou malé. Kvete v okolíku.

### Cnidium bhutanicum

oblasti: Bhútán

### Cnidium cnidiifolium

synonyma: Conioselinum cnidiifolium, Selinum cnidiifolium

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Manitoba, Rusko, Severozápadní Teritorium, V Evropa, Yukon

Roste v Rusku, Kanadě a na Aljašce. Dorůstá výšky až 60cm. Lodyha je od báze větvená. Spodní listy jsou 2 - 3x zpeřené. Barva květů je světlefialová až bílá. Kvítky tvoří 5 kopinatých lístků.

### Cnidium dauricum

synonyma: Aulacospermum cuneatum, Laserpitium dauricum

### Cnidium divaricatum

synonyma: C. argenteum, C. cuneatum

### Cnidium dubium (Jarva žilnatá)

synonyma: C. venosum, Kadenia dubia, Selinum dubium, Seseli dubium, Seseli venosum

oblasti: Česká republika, Estonsko, Francie, J Švédsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Střední Rusko, V Evropa, Z Rusko

Roste v Evropě a Asii od Francie po Bajkal. Dorůstá výšky až 1m. Lodyha je měkká, přímá a dutá, pouze málo větvená. Listy jsou 2 - 3x peřenosečné a vlastní úkrojky mají na spodní straně výraznou žilnatinu. Za květu odumírají. Kvete drobnými bílými květy v okolíku. Plody jsou hřebenaté, semena žebernaté. Patří mezi ohrožené druhy C2. Je jedovatá.

Vyhovují mu vlhké louky, bažiny, zaplavovaná místa, atp. v těžkou půdou bohatou na živiny.

### Cnidium japonicum

synonyma: Selinum japonicum

### Cnidium monnieri

synonyma: *C. confertum*, *C. microcarpum*, *C. mongolicum*, *Selinum monnieri*

oblasti: Čína, Indie, Korea, Laos, Mongolsko, Oregon, Rusko, Střední Asie, V Evropa, Vietnam

Pochází z Číny roste ale po celé severní polokouli. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 60 (i 80)cm. Pod zemí vytváří 2 - 3 kořeny. Spodní listy jsou kopinaté, dlouhé 3 - 8cm a široké 2 - 5cm a jsou 2 - 3x zpeřené. Vlastní úkrojky jsou pak čárkovité až kopinaté, dlouhé 0,3 - 1cm a široké 1 - 1,5mm. Kvete bílými květy v 2 - 3 (i 5)cm okolíku. Používá se v tradiční čínské medicíně.

Vyhovuje jí lehká půda a plné slunce.

Množí se semeny.

### Cnidium salinum

synonyma: *Kadenia salina*, *Ligusticum salinum*, *Selinum dubium* subsp. *salinum*, *Selinum salinum*

### Cnidium silaifolium (Jarva koromáčolistá)

synonyma: *C. apioides*, *C. orientale*, *C. silaifolium* subsp. *orientale*, *C. silaifolium* var. *orientale*

oblasti: Česká republika, Itálie, Malá Asie (Anatolie), Švýcarsko

Roste především v jižní Evropě a Malé Asii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 0,5 (v květu 1)m. Lodyha je rýhovaná. Listy mají celkově vejčitý tvar, ale jsou peřenosečné. Kvete bílými květy v okolíku. Plodem je 2nažka. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a suchá půda.

### Cnidium sinchianum

synonyma: *Selinum sinchianum*

Další informace:

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarva\\_%C5%BEilnat%C3%A1](http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarva_%C5%BEilnat%C3%A1)

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2775>

<http://www.naturabohemica.cz/cnidium-dubium/>

<https://www.rostliny.net/>