

Quercus corrugata

synonyma: Q. var. granulifera, Q. var. ipalensis, Quercus cyclobalanoides, Quercus reevesii

čeleď: Fagaceae

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Panama, Salvador

Pochází z Guatemaly, Belize, Salvadoru, Hondurasu a Panamy. Roste v podobě stromu o výšce až 20m. Mladé větve jsou tlusté 1,5 - 5mm, v mládí ochlupené a hnědé, olysávají, přechází do šedé barvy, pupeny jsou dlouhé 3mm, tvaru okrouhlevejčitého a barvy šedohnědé. Listy jsou tlusté, tvrdé, kopinaté až obkopinaté, někdy eliptické až obvejčité, pšičaté, báze klínovitá až zaoblená, okraj hrubě zubatý, zuby namířené směrem kupředu, hrotité, při bázi celokrajné, okraj rovný nebo úzce podvinutý, obě strany jsou mírně lesklé, horní strana starších listů může být mírně puchýřnatá, žilnatinu tvoří 12 - 18 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4cm, celková délka 5 - 15 (i 25)cm a šířka 2 - 5 (i 7)cm. Tyčinkové jehnědy jsou dlouhé 5 - 6mm, řídce huňaté. Pestíkové jsou dlouhé 5mm, 1 - 2květe. Plody jsou samostatné, umístěné na 0,5 - 1cm stopkách. Číška je široká 3 - 6cm, mělce pohárkovitá nebo polokulovitá. Žaludy jsou téměř kulovité až vejčité nebo podlouhlé, v průměru mají 3 - 5cm, jsou tmavěhnědé, v mládí řídce huňaté.

<https://www.rostliny.net/>