

Hordeum vulgare (Ječmen setý)

synonyma: *Frumentum sativum*, *Hordeum aegiceras*, *Hordeum bifarium*, *Hordeum coeleste*, *Hordeum distichon* subsp. *zeocrithon*, *Hordeum distichum*, *Hordeum gymnodistichum*, *Hordeum hexastichon*, *Hordeum hexastichum*, *Hordeum himalayense*, *Hordeum irregulare*, *Hordeum leptostachys*, *Hordeum macrolepis*, *Hordeum nigrum*, *Hordeum polystichon*, *Hordeum polystichon* var. *hackelii*, *Hordeum polystichon* var. *vulgare*, *Hordeum revelatum*, *Hordeum sativum*, *Hordeum sativum* subsp. *hexastichon*, *Hordeum sativum* subsp. *vulgare*, *Hordeum sativum* var. *coeleste*, *Hordeum strobelenense*, *Hordeum tetrastichum*, *H. f. hexastichon*, *H. subsp. hexastichon*, *H. subsp. medioasiaticum*, *H. subsp. spontaneum*, *H. subsp. tetrastichum*, *H. var. abdulbasirovii*, *H. var. bachteevii*, *H. var. brachyurum*, *H. var. chungense*, *H. var. coeleste*, *H. var. glabriviride*, *H. var. hexastichon*, *H. var. ismailii*, *H. var. lukyanovae*, *H. var. Iovii*, *H. var. multispiculum*, *H. var. pallidum*, *H. var. patimatae*, *H. var. revelatum*, *H. var. saidii*, *H. var. sikangense*, *H. var. trifurcatum*, *H. var. trofimovskajae*, *H. var. valentinae*, *H. var. zuleichatae*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Střední střeozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky 0,6 - 1,3m. Květenstvím je (2 -) 4 nebo 6tiřadý lichoklas tvořený 3jicemi přisedlých klásků, každý má 1 osinatý oboupohlavný květ, vřetenem je na uzlinách hustě krátce ochlupené, nečláňkované, ve zralosti nerozpadavé, pluchy prostředních klásků mají osinu délky 6 - 12cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- convar. *distichon* (Ječmen setý dvouřadý)
- var. *erectum* (Ječmen setý vzpřímený)
- var. *nigrescens* (Ječmen setý dvouřadý)
- var. *nigrinudum*
- var. *nudum* (Ječmen setý bezpluchý)
- var. *nutans* (Ječmen setý nicí)
- var. *zeocrithon* (Ječmen setý paví)

- convar. *intermedium* (Ječmen setý přechodný)
- convar. *labile* (Ječmen setý různotvarý)
- convar. *vulgare* (Ječmen setý víceřadý)
- f. *hexastichon*
- f. *tetrastichon*

- 'Weeskan'

<https://www.rostliny.net/>