

Senecio syringifolius

synonyma: *Gynura meyeri-johannis*, *Senecio elliotii*, *Senecio exsertiflorus*, *Senecio nyikensis*, *Senecio subpetitianus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Keňa, Malawi, Rwanda, Tanzánie, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Ugandě, Malawi, Zambii, Zimbabwe a Rwandě jako liána. Dorůstá délky 1,5 - 10m při průměru stonku 1,5cm. Listy jsou 3úhlé až vejčité, ve spodní 1/2 zubaté, dlouhé 3,8 - 10cm, široké 1,5 - 9cm, báze je zakulacená až uťatá nebo mírně srdčitá, žilnatina 5 - 7mičetná a řapíky jsou dlouhé 1,4 - 5,6cm. Květenstvím je vrcholík z úborů, zákrov je válcovitý, dlouhý 5,5 - 9mm, široký 2,5 - 3,5mm, tvoří jej 8 zákrovních listenů délky 5 - 8,5mm, okvětní lístky nejsou, terčové jsou žluté nebo béžově žluté, v počtu 15 - 20ks, koruna je dlouhá 6,5 - 9mm a laloky jsou dlouhé 1 - 1,9mm . Plodem je žebernatá nažka délky 3 - 4mm s chmýrem délky 5 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>