

# Betula alnoides

synonyma: *Betula acuminata* var. *argula*, *Betula acuminata* var. *arguta*, *Betula acuminata* var. *glabra*, *Betula acuminata* var. *lancifolia*, *Betula acuminata* var. *pilosa*, *Betula affinis*, *B. var. acuminata*, *Betula cylindrostachya* var. *pilosa*, *Betula cylindrostachya* var. *subglabra*, *Betula nitida*, *Betula nitida* var. *affinis*, *Betulaster acuminata*, *Betulaster affinis*, *Betulaster nitida*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Sichuanu, Yunnanu, Bhútánu, Myanmaru, Nepálu, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je červenohnědá nebo šedá. Mladé větve jsou růžovofialovočervené, žláznaté, holé, převislé. Listy jsou kopinaté a vejčitěeliptické, dlouhé 4 - 12cm, široké 2,5 - 5,5cm, papírovité, špičaté, báze okrouhlá až klínovitá, tenká, nepravidelně 2x pilovitá, z obou stran holá, na spodní straně na žilkách hnědě plstá, řapíky červené, ochlupené, dlouhé 1,5 - 4cm a žilnatinu tvoří 10 - 13 párů žilek. Samičí jehnědy jsou převislé, úzce válcovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 4 - 6mm, listeny dlouhé 3mm, 3laločné, semenná pouzdra obvejčitá, dlouhá 1,5 - 2mm, křídlo je 2x širší.

<https://www.rostliny.net/>