

Paronychia argentea (Stříbřenka stříbrná)

synonyma: Chaetonychia paronychia, Ferriera mediterranea, Illecebrum paronychia, Paronychia mauritanica, Plottzia paronychia

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JV Evropa, JZ Asie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Palestina, Portugalsko, Řecko, Sardinie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeší, jižní Evropě, severní Africe včetně Kanárských ostrovů a jihozápadní Asii. Patří mezi trvalky (i jednoletky). Vytváří kobercové porosty. Pod zemí vytváří ztlustlý dřevnatějící oddenek. Lodyhy jsou rozkladité, bohatě větvené, dlouhé 5 - 30 (i 50)cm a dokáží znovu zakořenit. Palisty jsou vejčité, bělavé až stříbřité. Listy jsou vstřícné, dlouze eliptické, obvejčité nebo vejčitékopinaté, špičaté, drsné, sivozelené, dlouhé 0,5 - 2cm a široké 1 - 5mm. Květenstvím je husté klubíčko o průměru 1,2 - 1,5cm, vlastní květy jsou nažloutlé, 5tičetné oboupohlavné, se stříbřitěbílými 5mm listeny na koncích výhonů, kalich má 1,5 (i 2)mm roztrěpené laloky. Plodem je nepukavá tobolka obsahující 1 hnědé semeno velikosti 1 - 1,5mm.

Vyhovují jí křoviny, písčiny, pole, okraje cest, skalní pukliny, atp. v suchu na plném slunci se suchým zimním režimem.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>