

# Hedera nepalensis

synonyma: *Cissus wallichiana*, *Hedera cinerea*, *Hedera helix* var. *chrysocarpa*, *Hedera helix* var. *cinerea*, *Hedera helix* var. *himalaica*, *Hedera himalaica*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Afganistán, Čína, Himálaj, Japonsko, Kašmír, Laos, Nepál, Pákistán, Vietnam

Roste od Afganistánu přes Kašmír po Himálaj, Laos, Vietnam a Japonsko v podobě pnoucí liány. Dorůstá délky až 30m. Větve jsou zelené, v mládí červené, mají 12 - 15tiramenné šupinaté chlupy, vytváří vzdušné kořínky a přírůstky jsou dlouhé 2 - 4cm. Listy na dlouhých větvích vejčité 3úhlé až kopinaté, různě laločnaté, mírně kožovité, zašpičatělé, na okraji mají 2 - 5 párů zubů anebo jsou celokrajné, dlouhé (2 -) 4 - 12cm, báze uťatá, starší exempláře mají listy celokrajné, dlouze vejčité a žilnatina je téměř souběžná s řapíkem. Kvete v 8 - 20tičetných okolících složených z hroznů, vlastní květy jsou žluté a mají 0,7 - 1,2cm stopku. Plodem je oranžová bobule délky 5 - 7mm a šířky 0,5 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Boaxing Star' - centrální lalok úzký a dlouhý
- 'Marbled Dragon' - listy dlouhé do 13cm, podél žilnatiny stříbřité
- var. *sinensis*/H. *himalaica*/H. *sinensis* - kmínky zelené, v mládí červenohnědé, přírůstky dlouhé 4 - 6cm, chlupy 12 - 15tipaprsčité; listy zelené (rašící hnědé), na mladých exemplářích 3laločné, dlouhé 7 - 9cm, široké 5 - 7cm, u starších eliptické, dlouhé 8 - 12cm, široké 4 - 6cm, žilnatina bledězelená; plody žluté, široké do 1cm
- 'Suzanne' - kmínky růžovofialovozelené, přírůstky dlouhé 3 - 5cm; listy matné, tmavězelené, dlouhé 5 - 7cm, široké 6 - 8cm, hluboce 5tilaločné, centrální lalok široký více než 1cm s dalšími zakrnělými laloky, postranní 1/3, stejně široké, bazální zpětně zahnuté, žilnatina je vyniklá a chlupy jsou 16 - 20tipaprsčité

<https://www.rostliny.net/>