

Hedera pastuchovii (Břečťan Pastuchův)

čeleď: Araliaceae

oblasti: Írán, Kavkaz, Rusko

Roste v Rusku a Íránu v podobě stálezelené popínavky. Dorůstá délky 2,5m. Kmínky jsou hnědozelené a světlehnědé, přírůstky dlouhé 3 - 4cm, řídce ochlupené, 8 - 12tipaprsčité. Listy zelené, na spodní straně bledězelené, holé nebo řídce hvězdčovitě šupinaté, dlouhé 4 - 12cm, široké 3 - 7cm, celokrajné, mírně zvlněné, žilnatina šedozelená, u sterilních výhonu variabilní, vejčité až kopinaté, hluboce srdčité až klínovité se symetrickým či asymetrickým párem laloků, listy na fertálních větvích kosočtvercovité, špičaté a řapíky řídce hvězdčovitě šupinaté. Kvete ve vzpřímených kulovitých 5 - 20tičetných okolících na 1,5 - 6cm stopkách, okolíky jsou samostatné nebo seskupené do 3 - 8mičetných hroznů, stopky květů dlouhé 0,6 - 1,2cm a květenství je hustě hvězdčovitě žlutohnědě šupinaté. Plody jsou vzácné, černé a široké 0,6 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ann Alla' - listy černozelelé, protáhlé

- var. cypria - kmínky růžovofialovozelelé, přírůstky dlouhé 4 - 5cm; listy tmavězelelé, nelaločnaté (občas se zakrnělými lalokami), dlouhé 7 - 9cm, široké 5 - 6cm, kopinatěvejčité, zašpičaté, báze uťatá až mírně srdčitá a chlupy 10 - 12tipaprsčité

<https://www.rostliny.net/>