

Salix acutifolia (Vrba špičatolistá)

synonyma: *Salix daphnoides* subsp. *acutifolia*, *Salix daphnoides* var. *acutifolia*, *Salix pruinosa*, *Salix violacea*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Kazachstán, Polsko, SV Evropa, V Evropa

Pochází ze severovýchodní a východní Evropy a Kazachstánu. Roste v podobě široce pravidelného středně hustého polokulovitého až kulovitého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m. Větve jsou dlouhé, prutovité, na konci převislé, červenohnědé (vzácně červené), ojíněné nebo žluté bez ojínění, lýko žluté, pupeny protažené, holé, černohnědé nebo načervenalé, dlouhé do 6mm. Palisty jsou kopinaté, špičaté, pilovité, dlouhé zhruba stejně jako řapíky. Listy jsou kopinaté, ale mohou být až čárkovité, dlouhé 5 - 15cm, široké 0,4 - 1,2cm, dlouze špičaté, báze klínovitá, okraj jemně pilovitý, z obou stran holé, na horní straně zelené, lesklé, spodní je naředlá a řapíky jsou žlutočervené, bez žláz, dlouhé 0,5 - 1,5cm. Jehnědy mají délku 3 - 6cm, 2 tyčinky, samčí jsou vejčité, samičí válcovité, šupiny špičaté, bílé ochlupené, vytrvávající, semeníky jsou holé. Používá se jako medonosná rostlina. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Streak' - výška do 9m; modrobíle ojíněné kmínky; listy bledězelené, úzké
- 'Lady Aldenham' - výška do 4m; kmínky i větve fialové až téměř černé; jehnědy větší
- 'Pendulifolia'/*S. pendulifolia* - nepravidelně široce protáhlá koruna; výška 6 (i 12)m; větve dlouze obloukovitě převisají, mladé větve převislé; palisty malé; listy téměř zcela visící, dlouhé 10 - 16cm, dlouze zašpičatělé, báze klínovitá, horní strana zelená, spodní namodralá, centrální žebro žluté, řapíky dlouhé 1 - 3cm; jehnědy pouze samčí, štíhlé, dlouhé 4 - 6cm
- var. *tatarica* - větve červené, ojíněné; listy čárkovité nebo kopinaté, široké 4 - 6mm
- var. *vitellina* - větve žluté bez ojínění

Dobře odolává suchu.

<https://www.rostliny.net/>