

## Crossandra (Krosandra)

čeleď: Acanthaceae

Roste v subtropech Afriky, Madagaskaru, Arábii a Indii v podobě stálezeleného polokeře nebo keře. Listy jsou tmavězelené. Květenstvím je hranační klas, vlastní květy jsou žluté až červené. Nejznámějším druhem je *C. infundibuliformis*. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Fortuna'

Vyžadují plné světlo nebo polostín, dobře propustnou půdu bohatou na živiny a minimální teplota je 15°C.

Množí se řízky nebo semeny.

### *Crossandra acutiloba*

### *Crossandra albolineata*

### *Crossandra angolensis*

oblasti: Angola

### *Crossandra arenicola*

### *Crossandra armandii*

### *Crossandra baccarinii*

### *Crossandra benoistii*

### *Crossandra cinnabarinia*

### *Crossandra cloiselii*

### *Crossandra douillotii*

### *Crossandra flava (Krosandra žlutá)*

oblasti: Tropická Afrika

Pochází z tropické západní Afriky. Kvete žlutými květy.

### Crossandra flavicaulis

### Crossandra friesiorum

### Crossandra fruticulosa

### Crossandra grandidieri

synonyma: Pleuroblepharis grandidieri, Pseudoblepharis grandidieri

### Crossandra greenstockii

### Crossandra horrida

### Crossandra humbertii

### Crossandra infundibuliformis

synonyma: C. axillaris, C. coccinea, C. infundibuliformis subsp. axillaris, C. infundibuliformis var. axillaris, C. nutans, C. oppositifolia, C. undulifolia, Harrachia spinosa, Justicia infundibuliformis, Ruellia infundibuliformis

oblasti: J Indie, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, V Indie

Pochází z Indie, Thajska a Srí Lanky. Roste v podobě stálezeleného polokeře až keře. Dorůstá výšky až 0,5 - 1 (i 1,5)m. Listy jsou vejčitěeliptické až kopinaté, špičaté, lesklé, tmavězelené, zvlněné, dlouhé 5 - 10 (i 12)cm, široké 2 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květy jsou vějířovité, růžovočervené až oranžové, seskupené do hustých kuželovitých hranatých až 10cm dlouhých klasů, listeny jsou ochlupené, kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,3 (i 1,5)cm, trubka má délku 2,5cm, pysk je dlouhý 1,5 - 2,5cm. Plodem je podlouhlá tobolka délky 1 - 1,2cm obsahující 4 semena délky 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Mona Wallhed' - výška do 50cm; listy lesklé, zelené; květy tmavě růžovočervené
- 'Ruser's Auslese' - květy červenooranžovorůžové

Vyhovuje ji slunném místě. Uchovávejte ve vlhké a pravidelně hnojené zemi za pokojové teploty. Starší rostliny mohou vyrostat větší rozdíly, obvykle se ale začínají pěstovat ze semen nebo se ořezávají. Má ráda rosení. Na zimu zálivku omezte. Přesazuje se v únoru a březnu. Hlavní výhony se zkrátí a ty se posléze rozvětví. Minimální teplota pěstování je 10°C.

Množí se řízky, které vsadíme do půdy se směsí rašelinu a písku. Po zformování kořenů můžeme přesadit do hlubšího květináče, kde nám již vykvetou. Semena se vysévají na jaře také do písčitorašelinné půdy.

## Crossandra isaloensis

### Crossandra johanninae

synonyma: C. wissmannii

## Crossandra leikipiensis

## Crossandra leucodonta

## Crossandra longehirsuta

## Crossandra longipes

## Crossandra longispica

### Crossandra massaica

synonyma: C. nilotica subsp. massaica, C. puberula var. smithii

oblasti: Afrika

Roste v Africe.

## Crossandra mucronata

## Crossandra multidentata

### Crossandra nilotica

synonyma: Barleria rhynchocarpa, C. nilotica var. acuminata, C. rhynchocarpa, C. smithii

oblasti: Tropická Afrika

Roste v tropické Africe. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou eliptické, mírně protažené, rovné a dlouhé do 10cm. Kvete v 2,5 - 7cm dlouhých klasech, listeny jsou dlouhé 1,3 - 2cm, ochlupené, koruna červená až oranžová, obvejčitá, trubka dlouhá 1,7 - 2cm a laloky jsou velké do 1,3cm.

## Crossandra nobilis

## Crossandra obanensis

## Crossandra pilosa

synonyma: *C. citrina* var. *pilosa*

### *Crossandra pinguior*

### *Crossandra poissonii*

### *Crossandra praecox*

### *Crossandra primuloides*

synonyma: *C. crocea*

### *Crossandra puberula*

synonyma: *C. jashi*, *C. pubescens*

### *Crossandra pungens*

oblasti: Tropická Afrika

Roste v tropické Africe. Dorůstá výšky 60 - 90cm při šířce 45 - 60cm. Listy jsou stálezelené, podlouhlé, matné, zelené a žilnatina perleťová. Kvete v klasech, listeny jsou štětinaté až trnité a oranžové.

Má ráda slunce nebo s menším stínem. pH substrátu by se mělo pohybovat od 6,1 - 7,5.

### *Crossandra pyrophila*

### *Crossandra quadridentata*

### *Crossandra raripila*

### *Crossandra rupestris*

### *Crossandra spinescens*

### *Crossandra spinosa*

synonyma: *C. parvifolia*

### *Crossandra stenandrium*

synonyma: *Barleria polytricha*, *C. citrina*, *Polythrix stenandrium*

### Crossandra stenostachya

synonyma: C. stenostachya var. somalensis, Sclerochiton stenostachyus

### Crossandra strobilifera

synonyma: C. citrina var. subintegra, C. cloiselii var. brevis, C. strobilifera var. brevis, Justicia strobilifera

### Crossandra subacaulis

### Crossandra sulphurea

### Crossandra tridentata

synonyma: C. cephalostachya

### Crossandra tsingyensis

### Crossandra vestita

### Crossandra zuluensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/crossandra-infundibuliformis/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1154>

<https://www.rostliny.net/>