

## Callitriche stagnalis (Hvězdoš kalužní)

synonyma: *Callitriche aestivalis*, *Callitriche dioica*, *Callitriche minor*, *Callitriche palustris* subsp. *stagnalis*, *C. f. caespitosa*, *C. f. heterophylla*, *C. f. terrestris*, *C. var. transsilvanica*, *C. var. vulgaris*, *Callitriche verna*

čeleď: Callitrichaceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, JZ Asie, Kalifornie, Katalánsko, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Montana, Německo, New Jersey, New York, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, S Afrika, Švýcarsko, Tennessee, V Evropa, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie, Z Rusko

Pochází z Evropy, jihozápadní a západní Asie a severní Afriky. V jiných lokalitách je pouze introdukován. Patří mezi trvalky a dvoudomé rostliny. Lodyhy dorůstají délky 0,1 - 0,4 (i 1)m. Listy plovou po hladině nebo jsou ponořené, plovoucí v růžici jsou zakulaceně kopistovitě, zpravidla bledězelené, ponořené jsou čárkovité až úzce kopinaté, eliptické nebo lžičkovité, dlouhé 1,2 - 2 (i 4)cm, široké 1 - 7,5 (i 9)mm a mají 5 - 7 žilek. Kvete bílými přisedlými párovými kvítky různého pohlaví, samčí mají 2 listeny délky 1,2mm, šířky 0,5mm, samičí mají také 2 uťaté listeny délky 2,5mm a šířky 1mm. Plodem je tvrdka délky (1,3 -) 1,6 - 1,8 (i 2)mm, šířky 1,2 - 1,4mm a plůdky jsou široce křídlaté (šířky 0,12 - 0,25mm).

Vyhovují mu mělké vody. Dokáže růst ve vlhkém vysychavém bahně i ve vodě.

<https://www.rostliny.net/>