

Salix cardiophylla

synonyma: *Chosenia cardiophylla*, *Chosenia maximowiczii*, *Chosenia urbaniana*, *S. var. urbaniana*, *Salix maximowiczii*, *Salix urbaniana*, *Salix urbaniana var. schneideri*, *Toisusu cardiophylla*, *Toisusu cardiophylla var. maximowiczii*, *Toisusu cardiophylla var. schneideri*, *Toisusu cardiophylla var. urbaniana*, *Toisusu urbaniana*, *Toisusu urbaniana var. schneideri*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Japonsko, S Asie, V Sibiř

Roste na východní Sibiři, Dálném východu a Japonsku v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 17 (i 35)m při průměru kmene 0,5 - 1m. Borka je hluboce brázditá, tlustě korkovitá. Větve jsou lesklé, sukovité, v mládí hnědé nebo červenohnědé, lesklé, holé, pupeny podlouhlé, červenohnědé, holé, lesklé. Palisty jsou podlouhlé, okrouhle ledvinovité, žláznatě pilovité, poloviční délky řapíků. Listy bývají bez žláz, eliptické, báze srdčitá nebo zaoblená, obě strany holé, horní zelená, spodní světlejší nebo vzácně nasivělá, dlouhé 3 - 9cm, široké 2 - 4,5cm, centrální žebro na spodní straně mírně ochlupené, žilnatinu tvoří 7 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Jehnědy mívají obvykle dlouhou stopku, jsou úzce válcovité, dlouhé 9 - 10cm, široké 5 - 7cm, šupiny opadavé, vejčité nebo široce obvejčité, tupé nebo uťaté, tyčinek bývá (4 -) 5 (i 8)ks, semeníky vejčité kuželovité, holé. Plodem je až 4,5mm tobolka.

<https://www.rostliny.net/>