

Adonis aestivalis (Hlaváček letní)

synonyma: *A. f. citrina*, *A. subsp. cretica*, *A. subsp. marginata*, *A. var. velutina*, *Adonis ambigua*, *Adonis ambigua var. flavus*, *Adonis annua var. phoenicea*, *Adonis autumnalis*, *Adonis bienertii*, *Adonis citrina*, *Adonis crinita*, *Adonis cristata*, *Adonis flammea*, *Adonis flava*, *Adonis inermis*, *Adonis inglisii*, *Adonis linnaei*, *Adonis maculata*, *Adonis maculata var. miniata*, *Adonis maculata var. ochroleuca*, *Adonis maculata var. pallens*, *Adonis micrantha*, *Adonis miniata*, *Adonis polymorpha*, *Adonis scrobiculata subsp. velutina*, *Adonis squarrosa*, *Cosmarium aestivale*

čeleď: Ranunculaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bulharsko, Česká republika, Francie, Idaho, Írán, Itálie, J Sibiř, Kalifornie, Kašmír, Katalánsko, Kazachstán, Krym, Libanon, Maroko, Missouri, Montana, Německo, New York, Oregon, Pákistán, Polsko, Řecko, Sardínie, Střední střeozemí, Sýrie, Švýcarsko, Ťan-šan, Tunisko, Turecko, Utah, Washington, Z Himálaj

Roste ve střední a východní Evropě, střeozemí až západní Himálaj, Kašmír a jižní Sibiř jako jednoletka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 50 (i 70)cm. Stonek je vzpřímený a zejména ve spodní části může být větvený. Listy jsou tenké, celkově eliptické, hluboce laločnaté, 2 - 3x zpeřené na čárkovité úkrojky šířky 1 - 1,5mm, spodní jsou řapíkaté a horní přisedlé. Kvete sytými červenooranžovými až červenými květy o průměru 1 - 2,5 (i 3)cm s 5 - 8mi korunními lístky s černou bází na dlouhých stopkách a kališní lístky mají 1/2 délku než korunní. Plodem je 4 - 7mm dlouhá nažka bez tmavé skvrny. Patří mezi chráněné druhy C2 a je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aestivalis* (Hlaváček letní pravý)
- subsp. *provincialis* - Írán
- subsp. *squarrosa* - výška (25 -) 30 - 40 (i 47)cm

Vyhovují mu okraje suchých vápenitých polí, příkopy, rumišťe, atp. na plném slunci.

Množí se semeny.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

<https://www.rostliny.net/>