

Leucanthemella serotina (Luhovnice pozdní)

synonyma: Chrysanthemum serotinum, Chrysanthemum uliginosum, Decaneurum serotinum, Leucanthemum serotinum, Matricaria serotina, Pyrethrum serotinum, Pyrethrum uliginosum, Tanacetum serotinum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Maďarsko, Michigan, Minnesota, New York, Nový Brunšvik, Ontario, Polsko, Quebec, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina, Wisconsin

Roste v oblasti panonské nížiny i na Balkáně v trsech jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5 (i 1,7)m. Stonek je ochlupený, v horní části max. chudě větvený. Listy jsou bohaté, přisedlé, dlouze kopinaté, řídce ostře pilovité, za bázi se 2 - 4mi laloky. Kvete v úboru o průměru 5 - 6cm, zákrov je dvouřadý, trubkovité květy žluté, oboupohlavné, jazykovité květy bílé a samičí. Velmi se podobají kopretinám. Plodem je válcovitá nažka délky 2 - 3mm s 8 - 12ti žebry bez kališního lemu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Herbstfreude' - výška 1 - 1,3m; květenství bílé a velké

Potřebuje vlhčí půdu i zaplavovanou půdu bohatou na živiny a plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorná.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>