

Ratibida pinnata (Ratibida zpeřená)

synonyma: Helianthus pinnata, Lepachys pinnata, Lepachys pinnatifida, Rudbeckia pinnata

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 1,2 (i 1,7)m. Listy mohou dorůst délky až 40cm a jsou rozdělené na několik větších kopinatých nebo oválných laloků. Kveté na dlouhém stonku žlutými květy v úboru, okvětní lístky mají délku až 6cm, na každém květu jich je 15, terčové květy mají délku až 2,5cm v počtu i více než 200ks v barvě žlutě zelené až hnědé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sunglow'

Vyhovují ji prémie, okraje silnic, atp. a půda sušší nebo i vlhká. Je plně mrazuvzdorná.

<https://www.rostliny.net/>