

Lonicera acuminata (Zimolez zašpičatělý)

synonyma: *Caprifolium henryi*, *Caprifolium loureiri*, L. var. *depilata*, *Lonicera affinis* var. *angustifolia*, *Lonicera alseuosmoides*, *Lonicera apodantha*, *Lonicera buddleioides*, *Lonicera flavescens*, *Lonicera fuchsioides*, *Lonicera giraldii*, *Lonicera henryi*, *Lonicera henryi* var. *angustifolia*, *Lonicera henryi* var. *fulvovillosa*, *Lonicera henryi* var. *setuligera*, *Lonicera henryi* var. *subcoriacea*, *Lonicera henryi* var. *transarisanensis*, *Lonicera henryi* var. *trichosepala*, *Lonicera leschenaultii*, *Lonicera loureiri*, *Lonicera loureiri* var. *major*, *Lonicera loureiri* var. *oblonga*, *Lonicera mindanaensis*, *Lonicera oxylepis*, *Lonicera oxylepis* var. *oblonga*, *Lonicera pampaninii*, *Lonicera philippinensis*, *Lonicera transarisanensis*, *Lonicera trichosepala*, *Lonicera vestita*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Bali, Čína, Filipíny, Indie, Írán, Jáva, Myanmar (Barma), Střední Asie, Sumatra, Zakavkazsko

Roste v Číně, Indii, Filipínách, Indonésii, Myanmaru, Sumatře, Javě a Bali v podobě šplhavého nebo plazivého stálezeleného nebo polostálezeleného keře. Mladé větve jsou hnědožlutě ochlupené nebo přitiskle ochlupené, někdy s drobnými žlázkami. Listy jsou vejčité podlouhlé nebo dlouze kopinaté až čárkovitě kopinaté, dlouhé 3 - 14cm, široké 2 - 4cm, kožovité, z obou stran hustě nebo řídce ochlupené, horní strana přitiskle ochlupená min. na centrálním žebru, báze zaoblená až téměř srdcitá, někdy široce klínovitá až uťatá, konec špičatý až hrotitý a řapíky jsou žlutě ochlupené, dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete v párech seskupených na koncích větví v chocholičnatém květenství nebo v paždí horní částí větví, stopky jsou dlouhé 0,4 - 2,3cm, listeny šídlovité, listence široce vejčité nebo obvejčité, tupé nebo zaoblené, kališní trubka eliptická, dlouhá 2 - 3mm, holá nebo ochlupená, ušty vejčité, vejčité kopinaté nebo úzce kopinaté, koruna žlutá, žlutobílá, načervenalá až červená, nálevkovitá, dlouhá 1,5 - 2,5cm, vnější strana holá nebo odstále ochlupená, někdy i žláznatá, 2pyská, trubka dlouhá 0,9 - 1,2cm, uvnitř krátce ochlupená, horní pysk vzpřímený, laloky okrouhle vejčité. Plody jsou modročerné, vejčité, tlusté 6 - 7mm, semena eliptická až podlouhlá, dlouhá 4 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminata*/*Caprifolium fuchsioides*/L. *affinis* var. *angustifolia*/L. *fuchsioides*/L. *henryi* var. *angustifolia*/L. *henryi* var. *setuligera*/L. *henryi* var. *subcoriacea*/L. *henryi* var. *transarisanensis*/L. *transarisanensis* - Čína, Indonésie, Myanmar, Filipíny; mladé větve, řapíky a okraje listů ochlupené, listy min. na spodní straně na centrální žilce
- var. *depilata* - Čína; povrch holý, pouze řapíky řídce ochlupené