

# Lonicera buchananii

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě popínavé rostliny. Větve jsou v mládí hustě šedobíle ochlupené. Listy jsou vejčité, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1 - 2,7cm, papírovité, na spodní straně šedobílé, sametová, krátce ochlupené, horní strana téměř holá kromě báze centrálního žebra, báze klínovitá nebo zaoblená, okraj podvinutý, konec hrotitý a řapíky dlouhé 3 - 5mm. Kvete v párech v paždí listů, stopky květů jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm, štíhlé, listeny listovité, čárkovité až kopinaté, dlouhé 0,4 - 1,4cm, ochlupené, listence 3úhlé, velké 1,5mm, šedobíle sametové, brvitě, kališní trubka vejčitá, velká 1,5 - 2mm, v horní 1/2 řídce ochlupená, ušty 3úhlé, řídce ochlupené, špičaté, koruna má velikost 2,5 - 5cm, je 2pyská, trubka velká 2,2 - 3,2cm, na vnější straně hustě hřebílkatá, uvnitř hustě ochlupená, horní pysk 4laločný. Plody nejsou známe.

<https://www.rostliny.net/>