

Lonicera cinerea

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Afganistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Xinjiang

Roste v Číně, Afganistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu v podobě opadavého zakrslého, někdy i polštářovitého bohatě větveného keře. Větve jsou v mládí krátké, hustě šedě dlouze odstále ochlupené, někdy i žláznaté, zimní pupeny vejčité, dlouhé 2 - 3mm, drobně žláznatě ochlupené, špičaté, kryté 3mi páry šupiny (spodní obklopuje celý pupen). Listy jsou vejčitěeliptické nebo eliptické, dlouhé 0,6 - 1,8cm, obě strany hustě drobně našedle ochlupené, často i žláznatě, spodní strana na žilkách přitiskle ochlupená, báze široce klínovitá nebo zaoblená, konec zašpičatělý a řapíky jsou krátké. Kvete žlutými trubkovitými květy o velikosti 1,4 - 1,5cm, vnější strana je hustě ochlupená, vnitřní drobně ochlupená, laloky horního pysku široce vejčité, velké 2mm, laloky spodního pysku úzce eliptické nebo podlouhlé, stopky květů dlouhé 1 - 2,5 (i 4)mm, listeny bývají kopinaté, někdy vejčité, dlouhé 5 - 8mm, na vnější straně přitiskle žláznatě ochlupené, okraj brvitý, kališní trubka holá, lem krátký, mělce zubatý. Plodem je téměř kulovitá bobule průměru 5 - 7mm.

<https://www.rostliny.net/>