

## Lonicera ferdinandii (Zimolez Ferdinandův)

synonyma: *L. f. beissneriana*, *L. f. franchetii*, *L. f. leycesterioides*, *L. f. vesicaria*, *L. var. induta*, *L. var. leycesterioides*, *L. var. typica*, *Lonicera leycesterioides*, *Lonicera vesicaria*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína, Korea, Mongolsko

Roste v Číně, Koreji a Mongolsku v podobě opadavého vzpřímeného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 3m. Větve bývají obvykle štětinatě ochlupená nebo červenohnědě žláznatá (i téměř holé), staré větve papilkaté, zimní pupeny dlouhé 4 - 5mm, mají pár člunkovitých šupin, které jsou z vnější strany plstnaté. Listy jsou při rašení nahnědlé, vejčité až vejčité kopinaté či kopinaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 2 - 7cm, papírovité, horní strana tmavězelená, spodní bledší, přitiskle ochlupená, na žilkách červenohnědě žláznatá, vzácně plstnatá, horní strana řídce přitiskle ochlupená nebo téměř holá, báze zaoblená až uťatá či mělce srdčitá, okraj může být zvlněný, brvitý a konec špičatý. Květy mají krátké stopky, listeny kopinaté nebo vejčité, dlouhé do 1,5cm, listence srostlé v pohárek, jsou obklopené 2mi sousedícími kališními trubkami o průměru 2,5mm, vnější strana je v mládí hustě dlouze i krátce ochlupená, vnitřní strana přitiskle huňatá, kališní lístky 3úhlé, špičaté, koruna bílá, později nažloutlá, dlouhá 1,3 - 2cm, vnější strana hustě ochlupená (i žláznatě), vzácně holá, uvnitř huňatá, 2pyská, horní pysk mělce 4laločný, spodní dlouhý, štíhlý, trubka vakovitě rozšířená. Plodem je červená vejčitá až kulatá bobule o velikosti do 1cm, obsahující 2 - 7 eliptických zploštělých semen délky 6 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *leycesterioides*/*L. leycesterioides* - Mongolsko; větve téměř holé; listy větší, dlouhé 4 - 7cm, podlouhle vejčité až kopinaté; koruna holá nebo mírně štětinatě ochlupená, ne žláznatá

<https://www.rostliny.net/>