

## Orostachys fimbriata

synonyma: *Cotyledon fimbriata*, *Cotyledon fimbriata* var. *ramosissima*, *O. var. grandiflora*, *O. var. shandongensis*, *Orostachys jiuhsienensis*, *Orostachys ramosissima*, *Sedum fimbriatum*, *Sedum fimbriatum* var. *ramosissimum*, *Sedum limuloides*, *Sedum ramosissimum*, *Umbilicus denticulatus*, *Umbilicus fimbriatus*, *Umbilicus ramosissimus*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Číta, JV Čína, Korea, Mongolsko, Střední Čína, SV Čína, Vnitřní Mongolsko

Roste v Číně, Mongolsku, Sibiři a Koreji. Listy vytvářejí růžici, jsou čárkovité až kopinaté, ostnitě špičaté, dlouhé 1,9 - 3cm a široké 2 - 5mm. Květenství je vysoké 10 - 20 (i 40)cm, hrozen je hustý, dlouhý Existuje \* 25cm, široký 10 - 20cm, listeny čárkovité, zašpičatělé, vlastní květy mají až 1cm stopku, kališní lístky podlouhlé, dlouhé 1 - 3mm, korunní lístky jsou elipticky kopinaté, zašpičatělé, červené nebo bílé, dlouhé 5 - 6mm, široké 1,2 - 1,5mm. Plodem je měchýřek se zobákem délky 1mm a obsahuje mnoho vejčitých semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Soochow'

<https://www.rostliny.net/>